2023 - IID - MD4043 - Eksamen 3
Eksamensdato: 2023-12-15

1
Kvinne 62 år har nylig hatt et underarmsbrudd og er derfor henvist til beintetthetsmåling som viser uttalt osteoporose i lumbalcolumna med T-score -3,2 samt osteoporose i lårhals og total hofte. Normal kalsium og D-vitaminstatus.
Hvilken behandling vil du gi denne pasienten?

A Østrogen/gestagen
Hormonbehandling bør startes like etter menopause og før 60 årsalder
B Teriparatid (PTH-analog)
Selv om hun har uttalt osteoporose skal en i henhold til norske refusjonsregler velge bisfosfonat primært
C Denosumab (Prolia)
Ikke førstevalg i behandling av osteoporose. Er indisert hos de som er noe eldre
D X Bisfosfonat
Riktig svar.

00001657c362545ae0

2
En 40 år gammel mann har de siste årene fått påvist hypertensjon og type 2 diabetes, og nylig hadde han en tibia-fraktur etter et lite traume. Beintetthetsmåling viste at han hadde uttalt osteoporose i lumbalkolumna, med gjennomsnittlig T-score < -3,0.
Han er moderat overvektig, har BMI på 30, et rundt ansikt, relativ stort abdominalt omfang med brede striae, samt tynne armer og bein.
Du lurer på om han kan ha autonom endogen hyperkortisolisme. Han bruker ingen glukokortikoider og har normal nyrefunksjon.
Ditt første steg i videre diagnostikk er:

A MR hypofyse
Feil. Bildediagnostikk er aktuet kun etter påvist hyperkortisolisme, og ikke-supprimert ACTH.
B CT binyre
Feil. Bildediagnostikk er kun aktuelt etter at en evt har påvist hyperkortisolisme, og CT binyre er da kun aktuelt ved supprimert ACTH
C X Spyttkortisol sen kveld
Riktig. Denne prøven kan enkelt tas hjemme som en første screeningtest. Spyttprøven må da tas på et tidspunkt hvor en forventer lav verdi, derfor sen kveld (like før leggetid).
D s-kortisol og s-ACTH i blodprøve fastende morgen
Måling av kortisol og ACTH om morgenen vil gi relativt liten informasjon, da det er om morgenen en vanligvis har de høyeste nivåene av disse hormonene

---

00001657c362545ae0

3
En 30 år gammel kvinne kommer til kontroll for primær binyrebarksvikt som hun har hatt i et par år. Hun forteller om salthunger og svimmelhet, og slitenhet spesielt ettemiddag/kveld. Hun bruker kortison acetat 25 mg hver morgen og fludrokortison (Florinef) 0,05 mg hver morgen. Vekt 50 kg. Ingen ødemer. Blodtrykk er på 95/60, p: 90. Ortostatisk blodtrykksmåling viser fall til 85/60, P: 110. Blodprøver viser p-Natrium 133 mmol/l (ref 136-144). Hvilke medikamentendringer anbefaler du?

A Ingen endringer.
Feil, både kortisondosen og florinefdoen bør endres.
B Øke kortison acetat til 50 mg hver morgen, uendret Florinefdose
Feil, kortisondosen bør fordeles på 2 eller 3 doser /dag og Florinefdosen burde økes
C Øke Florinef til 0,1 mg daglig, uendret kortisondose
Ikke mest riktig. Det er riktig å øke Florinefdosen, men kortisondosen bør deles på 2 eller 3 doser/ dag.
D X Kortison acetat endres til 12,5 mg morgen og 12,5 mg middag, Florinef økes fra 0,05 til 0,1 mg x1
Riktig. Kortison acetat bør deles på 2 eller 3 doser per dag, siste dosen senest ca kl 18. Pga salthunger bør hun også øke florinefdosen.

00001657c362545ae0

4
En kvinne oppsøker lege 5 måneder etter fødsel pga vekttap og hjertebank. Det påvises hypertyreose med fritt T4 40 pmol/L og TSH <0,01 mIU/l. Hun har ingen smerter over tyroideakjertelen.
Hvilke 2 differensialdiagnoser er mest aktuelle?

A Postpartum tyreoditt og knutestruma
feil, knutestruma debuterer vanligvis ikke etter fødsel, mest vanlig hos eldre
B X Graves' sykdom og postpartum tyreoiditt
Riktig! Etter fødsel er det risiko for postpartum tyreoditt og debut eller residiv av Graves' sykdom. Måling av TRAS og anti-TPO vil vanligvis kunne skille disse tilstandene.
C Graves' sykdom og subakutt tyreoiditt
Feil, Graves' sykdom kan residivere postpartum, men subakutt tyredoitt gir ofte et annet symtombilde med smerter på halsen.
D Postpartum tyreoditt og subakutt tyreoditt
feil, subakutt tyreoiditt gir oftest smerter på halsen.

00001657c362545ae0

5
En mann blir henvist til endokrinologisk poliklinikk fordi det er funnet lavt testosteron under utredning av infertilitet. Det er påvist testosteron på 1 nmol/l (ref. 6,7 - 31,9 nmol/l), LH er på 32 IU/L (ref 0,9-8,4).

Hva gjør du videre?

A Sjekker øvrige hormonakser fra hypofysen
Feil, dette er ingen hypofysesvikt, høy LH tilsier en "frisk" hypofyse, svikten sitter på testikkelnivå
B Starter testosterontilskudd
Det bør tilbys testosteron, men det er viktig å få avklart årsak først
C X Bestiller kromosomanalyse
Riktig. Dette er en primær hypogonadisme. Det må avklares mtp på Klinefelter syndrom som er en vanlig årsak til primær hypogonadisme. De fleste er 47XXY, mosaikktilstander finnes også
D Bestiller MR hypofyse
Feil, dette er ingen sentral årsak til hypogonadisme

00001657c362545ae0

6
Hvilke av disse prøvesvarene er forenlig med sekundær hyperparatyreoidisme?

A Høy kalsium, høy PTH
Feil. Forenlig med primær hyperparatyreoidisme.
B Høy kalsium, lav PTH
Feil. Lav PTH er ikke forenlig med noen form for hyperparatyreoidisme
C X Lav kalsium, høy PTH
Riktig. Ved sekundær hyperparatyreoidisme stiger PTH på grunn av lav kalsium. Årsaken til lav kalsium er ofte vitamin D-mangel eller nyresvikt
D Lav kalsium, lav PTH
Feil. Lav PTH er ikke forenlig med noen form for hyperparatyreoidisme

---

00001657c362545ae0

7
En 45 år gammel mann oppsøker lege pga potensproblemer. Han angir at han ikke har følt seg helt i form de siste par årene. Han er sliten, har hodepine daglig og svetter mye. Noen i bekjentskapskretsen har bemerket at han har forandret utseende. Han synes han ser noe dårligere enn før, og når han kjører bil kan han bli overrasket over biler som kommer inn fra siden som han ikke har registrert.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Prolaktinom
B X Veksthormonproduserende hypofyseadenom
Riktig svar. Her beskrives helt typiske symptomer på akromegali, samt at sykehistorien gir mistanke om redusert sidesyn.
C Ikke-hormonproduserende hypofysetumor
D Craniofaryngeom
E ACTH-produserende hypofyseadenom

00001657c362545ae0

8
En mann på 58 år jobber som bussjåfør. For et år siden fikk han påvist diabetes type 2, men nå er blodsukkeret for høyt tross endringer i levevaner. Han har fått vite av kolleger at det er noen medikamenter mot diabetes som han ikke kan bruke dersom han skal kunne jobbe videre som bussjåfør. Du er hans fastlege og forteller ham at han ikke kan bruke medikamenter som kan føre til for lavt blodsukker (hypoglykemi).
Hvilket medikament/medikamentklasse kan gi hypoglykemi?

A SGLT2-hemmer
B X Sulfonylurea
Riktig svar. Sulfonylureapreparater stimulerer insulinproduksjonen uavhengig av glukosenivå, og hypoglykemi er en kjent, mulig bivirkning
C Metformin
D GLP1-analog

00001657c362545ae0

9
En 82 år gammel kvinne fraktes til akuttmottaket med ambulanse. Hun er i dårlig allmenntilstand og har nedsatt bevissthet, GCS 8. Hun har ikke kjent diabetes, men i ambulansen er det målt kapillært blodsukker på «high», det vil si >30 mmol/l.
Hvilke to analyser vil raskt kunne avgjøre om pasienten har diabetisk ketoacidose (DKA) eller hyperosmolær hyperglykemisk syndrom (HHS)?

A Bikarbonat (blodgass) og pH (blodgass)
Ikke mest riktig. Ved diabetisk ketoacidose foreligger metabolsk acidose, som da vanligvis vil gi lav pH i tillegg til lav bikarbonat, med mindre acidosen er såpass lettgradig at en klarer å kompensere respiratorisk. Da kan pH være tilnærmet normal. Ved ketoacidose foreligger metabolsk acidose alltid, mens det ved HHS også kan foreligge metabolsk acidose dersom samtidig laktacidose eller alvorlig nyresvikt. Uten ketonmåling kan en ikke helt sikkert skille tilstandene raskt, men må vente på laboratorieanalyser av kreatinin (laktat måles i blodgass).
B Glukose (kapillært/blodgass) og ketoner i urin
Ikke mest riktig. For å kunne skille de to tilstandene er det nødvendig å vite om det foreligger metabolsk acidose, og da må en måle syre-basestatus i blodgass, dvs bikarbonat evt pH. Det kan være lette utslag på urin-ketoner også ved HHS. En har nå mulighet til å måle ketoner i blod, og dette foretrekkes også framfor urinmåling fordi det er mer spesifikt og måler direkte ketonsyrene og ikke kun aceton (ikke ketonsyre) slik som urinmålingen gjør.
C X Bikarbonat (blodgass) og ketoner i blod (kapillært)
Riktig svar. Det som karakteriserer diabetisk ketoacidose, er metabolsk acidose som påvises ved lav bikarbonat samt tilstedeværelsen av ketoner i blod. Ved begge tilstander foreligger hyperglykemi (med unntak av euglykemisk ketoacidose grunnet bruk av SGLT2-hemmer), som ofte er mer uttalt ved HHS.
D Bikarbonat (blodgass) og glukose (kapillært/blodgass)
Ikke mest riktig. Høy glukose og lav bikarbonat (metabolsk acidose) vil gi en mistanke om ketoacidose, men det kan også foreligge metabolsk acidose av annen årsak, som nyresvikt og laktacidose. En bør derfor også måle ketoner, helst blod-ketoner.

00001657c362545ae0

10
Du er fastlege for en mann på 52 år med nyoppdaget type 2 diabetes. Han er ellers frisk. På hvilket tidspunkt bør du henvise han til øyelegeundersøkelse?

A Han bør henvises til øyelege 3 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematisk-oyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling

B X Han bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt
Riktig svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematisk-oyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling

C Han bør henvises til øyelege 5 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematisk-oyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling

D Han bør henvises til øyelege 2 år etter diagnosen type 2 diabetes
Feil svar. Pasienter med diabetes type 2 bør henvises til øyelege ved diagnosetidspunkt fordi de allerede da kan ha mikrovaskulære komplikasjoner. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=retinopati-og-systematisk-oyeundersokelse-2683#hyppighet-av-øyeundersøkelse-ved-diabetessterk-anbefaling

---

00001657c362545ae0

11
Du går visitt ved bryst/endokrinkirurgisk avdeling. Første pasient er en 51 år gammel dame. Hun fikk utført en total thyroidektomi pga et ikke-toksisk nodulært struma i går. Ukomplisert operasjon og hun har det helt fint. Hva er viktig å gjøre nå?

A Forordne Levaxin-behandling i 4 uker.

B X Forordne livslang Levaxin-behandling.
Pasienter som har fått operert bort hele thyrodea trenger livslang Levaxin-behandling. Dette startes vanligvis første postoperative dag.

C Sjekke stoffskifteprøvene hennes nå.

D Informere henne om at hun må få sjekket stoffskiftet hos fastlege etter en uke.

00001657c362545ae0

12
En 63 år gammel kvinne kommer til fastlegekontoret ditt med en kul lateralt i høyre bryst som hun oppdaget for tre dager siden. Ved undersøkelse palperer du en 2x2cm fast oppfylning i brystet, ingen hudaffeksjon. I høyre axille har hun en forstørret lymfeknute. Hun er fra tidligere frisk og føler seg for øvrig i fin form. Hennes mor fikk cancer mamma i slutten av 60-årene. Hva er neste steg nå?

A Avvente, ber henne komme tilbake om 14 dager hvis kulen ikke har forsvunnet til da.

B Palpasjonsveiledet cytologi på fastlegekontoret.

C X Trippeldiagnostikk.
Her er det mistanke om cancer mamma så da er trippeldiagnostikk riktig.

D Mammografi.
Mammografi er ikke nok for å utrede mistanke om ca mamma.

00001657c362545ae0

13
En 51 år gammel kvinne har fått utført en total thyroidektomi. Du blir tilkalt til sengepost neste formiddag da pasienten klager over nummenhet og «prikkinger» i fingre, tær og rundt munnen, ellers upåfallende status. Hva er sannsynlig årsak til disse symptomene?

A Permanent hyperkalsemi.
B Cerebrovaskulær hendelse.
C Hyperventilasjon.
D X Forbigående hypokalsemi.
Dette er typiske symptomer på hypokalsemi. Postoperativ påvirkning av parathyroidea kan gi transient postoperativ hypokalsemi (i 5% av tilfellene utvikler dette seg til en permanent hypokalsemi).

00001657c362545ae0

14
En 63 år gammel kvinne har ved mammografi-screening fått påvist en 8mm cancer mamma i venstre bryst. For øvrig ingen patologi i brystene, ingen patologiske lymfeknuter i axillene. Hun er fra tidligere frisk og bruker ingen medisiner. Gentesting er negativ. Hva vil anbefalt operativ behandling være her?

A Brystbevarende kirurgi og axilledisseksjon.
Brystbevarende kirurgi er riktig for en liten tumor som dette. Når det ikke er påvist metastaser i axillen preoperativt gjør man ikke axilledisseksjon.
B Mastektomi og axilledisseksjon.
Begge alternativer er feil.
C Mastektomi og vaktpostdiagnostikk.
Man anbefaler ikke mastektomi for en slik liten tumor. Vaktpostdiagnostikk er riktig.
D X Brystbevarende kirurgi og vaktpostdiagnostikk.
Riktig.

00001657c362545ae0

15
Hva er hyppigste konsekvens av anovulasjon hos kvinnen?

A X Uregelmessige/ uforutsigbare / manglende blødninger
Dette er hyppigste konsekvens- idet det gjelder alle med sviktende eggløsning
B Frykt for uplanlagt graviditet
forekommer, men kan lett avklares med å ta en gravitest.
C Barnløshet
Feil svar. De aller fleste kan oppnå graviditet med stimulering av egne egg og evt assistert befruktning, og i verste fall med bruk av donoregg.
D Osteoporose
De fleste tilfeller av anovulasjon skyldes PCOS, disse har normale eller økt østradiol.- og derved ikke økt risiko for osteoporose.

00001657c362545ae0

16
En 34 år gammel kvinne utredes for barnløshet. Hun har i 3 år forsøkt å bli gravid, har samleie 2 ggr per uke med sin samboer som har 2 barn fra et tidligere forhold. Pasienten er selv gravida 1, en tidlig provosert abort da hun var 18 år. Hun fikk en klamydiainfeksjon i etterkant av aborten. Hun har betydelig dysmenore og også noe dyspareuni.
Fertilitetsavdelingen har ønsket å laparoskopere henne og finner følgende (se bilde) (peritoneal endometriose):
Hva er mest riktige behandlingen her?



2

A Fjerne tubene
Dilaterte og skadde tuber kan redusere muligheten for å oppnå graviditet, men her er det ingen opplysninger om skadde tuber

B Gi en supprimerende hormonbehandling
Dette er en fin behandling, men vil ikke gjøre henne gravid!

C Skylle gjennom tubene med metylenblått
Dette er en diagnostisk metode for å finne ut om tubene er åpne eller ikke, i noen tilfalle kan kvinnen bli spontant gravid rett etterpå, men ikke alltid

D X Fjerne (ekstirpere) de små blodblemmene (peritoneal endometriose) (blå piler)
Klanskje mest nyttig her, tar bort inflammasjonen og kan gjøre det lettere å oppnå graviditet

00001657c362545ae0

17
En 26 år gammel kvinne tar kontakt med deg som fastlege på grunn av plagsom utflod fra skjeden. Hun er frisk, har fast partner og bruker p-pille. Utfloden har vart i 6 uker. Normal vannlating og avføring. Hun har ingen magesmerter eller andre symtomer.
Ved gynekologisk undersøkelse ser du tynn, grålig utflod i skjeden. Du måler pH > 4,5. Applikasjon av 1 dråpe 10 % kalilut på litt utflod på et objektglass gir positiv "snifftest". Ved mikroskopisk undersøkelse av saltvannspreparat finner du over 20 % clueceller. Cervix inspiseres makroskopisk upåfallende. Ved bimanuell palpasjon er uterus normalstor og fritt mobil, ikke ruggeøm. Du palperer ingen oppfylninger over adnexa.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Candida
B Klamydia
C Endometritt
D X Bakteriell vaginose
Oppfyller 4 av 4 Amsels kriterier for bakteriell vaginose

00001657c362545ae0

18
En kvinne på 45 år kommer til deg som allmennlege. Hun har merket rikeligere menstruasjonsblødninger de siste 6 måneder, må bruke både bind og tamponger og blør i tilsammen 10 dager hver syklus. Menstruasjonen er ellers helt regelmessig. Hun har noe trykk eller ubehag i nedre venstre del av abdomen og dype støtsmerter ved samleie.
Hun ønsker at du undersøker henne. Ved bimanuell palpasjon finner du en fast oppfylning i nedre del av abdomen, det kjennes ut som uterus er myomatøst forstørret til 3-4 fingerbredder nedenfor navlen.
Hvilken billeddiagnostisk undersøkelse vil gi best mulighet for differensialdiagnostikk her?

A X MR abdomen/bekken
Vil gi den beste oppløsning her og best diagnostikk
B Vaginal ultralyd
Denne gir ganske bra oppløsning og vil sannsynligvis være diagnostisk, men er ikke like god som MR bekken/abdomen
C Abdominal ultralyd
Denne gir ganske bra oppløsning og vil sannsynligvis være diagnostisk, men er ikke like god som MR bekken/abdomen
D CT abdomen/bekken
Gir dårlige billedkvalitet enn MR bekken

00001657c362545ae0

19
En 45 år gammel kvinne oppsøker deg som fastlege pga uregelmessige og tildels kraftige blødninger siste halvåret. Tidligere har hun hatt regelmesige månedlige blødninger. Hun har fulgt Livmorhalsprogrammet, siste cervix cytologi tatt for 2 år siden var normal.
Du gjør gynekologisk undersøkelse og finner normale forhold ved inspeksjon av cervix, og du palperer en normal stor uterus. Hva er den mest sannsynlige årsak til pasientens blødningsforstyrrelser?

A Endometritt
Lite sannsynlig, ingen opplysninger om infeksjon.
B Endometriecancer
Endometriecancer er relativt sjelden premenopausalt, men kan forekomme perimenopausalt (bør utelukkes).
C Endometriepolypp
Dette kan være en mulig diagnose, men ikke mest sannsynlig.
D X Hormonforstyrrelser
Dette er den mest sannsynlige diagnosen tatt hennes alder i betraktning og de andre svaralternativene.

00001657c362545ae0

20
Hva er den vanligste spredningsmåten ved ovarialcancer?

A Hematogen spredning.
Det forekommer sjelden fjernmetastaser (v/hematogen spreding) ved primærdiagnostikk av ovarialcancer.
B Sjelden spredning.
Tidlig stadium (stadium 1) diagnostiseres sjeldent.
C Lymfogen spredning.
Endel pasienter har spredning til lymfeknuter på diagnosepunktet, men den direkte spredningen er mest vanlig.
D X Direkte spredning.
Dette er desidert den vanligste spredningsmåten ved ovarialcancer. Ca 70% av ovarialcancer pasientene har spreding til bukhulen (bukhinne, serosaoverflaten på tarm, uterus/tuber) når diagnosen stilles.

00001657c362545ae0

21
Ei 22 år gammel kvinne opprinnelig fra Somalia, bodd 3 måneder i Norge, tar kontakt med deg som fastlege 6 uker etter vaginal fødsel til termin. Hun har normal renselse, men føler at hun må tørke seg hele tida uten at det blir tørt nedentil. Hun er afebril og har ingen svie ved vannlating. Ved undersøkelse får du ikke helt oversikt over anatomien, men du inspiserer det du tror er en episiotomi i fin tilheling. Urin-stix viser 3+ på blod og 3+ på leukocytter.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Endometritt
B Klamydiainfeksjon
C Tuberkulose i urinveiene
D X Fistel fra urinveiene
Fistler kan lett oppstå hos kvinner som er omskjært og som er tilfelle hos mange kvinner fra Somalia.

00001657c362545ae0

22
Syntetisk brokknett kan brukes ved operasjon for descens i underlivet.
Hos hvilke pasienter er brokknett indisert?

A X Hos eldre pasienter med residiv av descens
Hvis tidligere descensoperasjon ikke har kommet i mål kan nett være et alternativ
B Hos pasienter med bindevevssykdom
Dette er ikke noen indikasjon i seg selv for nett
C Hos eldre, skrøpelige pasienter
Her er heller ringbehandling eller enkel operasjon som gjenlukking av vagina (kolpokleise) indisert
D Hos yngre pasienter, der risiko for residiv av descens er størst
Dette er feil, da nettbehandling kan ha bivirkninger som blottlegging av nettet og smerter ved samleie.

00001657c362545ae0

23
En 45 år gammel gift kvinne kommer til deg som hennes fastlege. Hun er Para 3 og har nylig hatt en provosert abort. Hun er lett overvektig og røyker 5 sigaretter per dag, men er ellers frisk.
Hvis du skal anbefale en sikker prevensjon for henne, hva vil du da helst anbefale?

A X Hormonspiral
Denne er veldig sikker, og gir ikke økt risiko for blodpropp selv om hun røyker
B Pessar
Dette kan brukes men er også mindre sikkert for en kvinne som fortsatt er fertil
C Kondom
Selv om hun er 45 år, er dette for usikker prevensjon for henne, siden hun nylig har hatt en provosert abort og åpenbart er fertil fortsatt
D Kobberspiral
Selv om hun nylig har vært gravid og åpenbart ovulerer, vil hun i løpet av få år ha økt sannsynlighet for kraftige menstruasjoner grunnet relativ østrogen overvekt i forhold til gestagen fra corpus luteum, derfor vil kobberspiral kunne gi henne økte menstruasjonsblødninger

---

00001657c362545ae0

24
Hva er den viktigste indikasjonen for systemisk østrogenbehandling ved perimenopause?

A Tørre vaginale slimhinner og dyspareuni
Her bør man heller velge lokale østrogener
B Uregelmessige blødninger
Dette er feil, heller velge et gestagenpreparat
C Forebygging av benskjørhet og brudd
Her er det heller calcium/Vit D og bisfosfonater som er førstevalg
D X Plagsomme hetetokter
Det er kun plagsomme hetetokter som er indikasjon på MHT-behandling

---

00001657c362545ae0

25
En 16 år gammel jente kommer til deg og ønsker råd om prevensjon. Hun har hatt regelmessig menstruasjon siden hun var 12 år. Hun har ca annenhver måned så sterke menstruasjonssmerter at hun må være hjemme fra skolen. Hun har en kjæreste og har hatt samleie med han noen ganger. Hva er det beste rådet til en slik jente ang. valg av prevensjon?

A Du tilyr henne p-plaster siden dette gir høyere compliance enn p-piller
Feil, p-plaster er ikke førstevalg pga noe høyere risiko for blodpropp enn de lavdoserte p-pillene
B X Du tilbyr henne en lavdosert monofasisk p-pille
Antakelig førtevalg siden dette som regel oppfattes som minst invasivt og enklest
C Du kan ikke tilby henne prevensjon siden hun er < 18 år, da må hun ha foreldre eller verge med på samtalen
Feil, pasienter er helsemessig myndig fra de er 16 år
D Du tilbyr henne p-sprøyte
Feil, p-sprøyte er høydose gestagen og bør pga risiko for senere osteoporoseutvikling, ikke gis før 18 års alder

---

00001657c362545ae0

26
Hvilken histologisk type er vanligst ved cervix cancer?

A Nevroendokrint carcinom
Svært sjeldent
B X Plateepitelcarcinom
Utgjør 80-85% av cx cancer
C Adenocarcinom
Utgjør 10-15 % av cx cancer
D Klarcellet carcinom
Svært sjeldent

00001657c362545ae0

27
En mann på 45 år med revmatoid artritt behandles rituximab (anti-CD20 antistoff) som påvirker hans produksjon av immunglobuliner. Han innlegges i sykehus med høy feber og redusert allmenntilstand. Hvilken av følgende bakterier har han en øket risiko for å bli rammet av?

A Listeria monocytogenes
B E. coli
C Gruppe A streptokokker
D X Pneumokokker
Pasienter med hypogammaglobulinemi er utsatt for residiverende luftveisinfeksjoner (otitter, sinusitter og pneumonier) med pneumokokker og H influenzae. Dette er kapselkledde bakterier hvor opsonisering med immunglobuliner er avgjørende for effektiv fagocytose.

00001657c362545ae0

28
Som LIS1 på indremedisinsk avdeling blir du oppringt av sykepleier på post om en 84 år gammel kvinne, som ligger inne for hjertesvikt. Hun har ingen vannlatingsplager. Hun har imidlertid urin med stygg lukt og sykepleier har undersøkt urinen med stiks. Den viser: leukocytter 0, protein ++, nitritt +. Sykepleier foreslår å starte antibiotikabehandling i form av trimetoprim mot urinveisinfeksjon.
Hva er mest korrekt i denne situasjonen?

A Umiddelbar behandling med trimetoprim p.o. etter først å ha sendt prøve av urinen til dyrkning
B X Det er ikke indikasjon for antibiotikabehandling eller ytterligere prøver
Funn av nitritt og protein i på urinstiks kan være forenlig med asymptomatisk bakteriuri, men det skal ikke behandles i denne situasjonen og det er derfor ikke indikasjon for å ta urin dyrkning når pasienten ikke har symptomer.
C Kontrollere urinstiks og ved samme resultat, starte en behandling med trimetoprim p.o.
D Ta en urin dyrkning og vent på svar før du tar stilling til antibiotikabehandling

00001657c362545ae0

29
En 65 år gammel mann med svingende feber opp mot 39 °C siste 4 uker, nattesvette og vekttap 6 kg innlegges til vurdering. Ut over det har han ingen symptomer eller kliniske funn. Blodkultur tas i mottak, røntgen thorax er negativ, urin stix er også negativ. Blodprøver viser: Hb: 7,8 g/dL (Ref 13,4 - 17,0), SR: 70 mm/time (Ref≤ 17), CRP: 210 mg/L (Ref< 5).
Hvilken undersøkelse bør man bestille først i den videre utredningen av denne pasienten?

A MR-columna for å se etter spondylodiskitt
B Beinmargsbiopsi for å se etter lymfom
C PET-scan for å se etter metastaser fra cancer
D X CT-abdomen for å se etter intraabdominal abscess eller malignitet
CT-abdomen er den viktigste undersøkelsen i begynnelsen av utredningen av feber av ukjent årsak da intraabdominale abscesser, levermetastaser og koloncancer er hyppige underliggende årsaker. Tidlig MR-columna bare ved ryggsmerter. Lymfomutredning med beinmargsbiopsi kommer senere. PET er først aktuelt når førstelinjeutredningen er negativ.

00001657c362545ae0

30
I akuttmottak ved et mindre lokalsykehus mottar du en 20 år gammel jente som er urolig og sløv. Hun kom hjem fra 2 ukers ferie i Tanzania 3 uker tidligere og har hatt svingende feber i 3 dager. Det siste døgnet har hun blitt påfallende irritabel og har sovet mye av tiden. Hun har diaré og mørk, rød urin. Puls 130, respirasjonsfrekvens 21, Blodtrykk 120/80 mmHg og temperatur 38.5^{o}C. Hun er ikke nakkestiv. Blodprøver tatt før innkomst er vist i tabellen nedenfor.

Analyse	Svar	Referanseområde
CRP	21 mg/L	< 4 mg/L
Kreatinin	201 µmol/L	45-90 µmol/L
Trombocytter	42 x 10^9/L	165 - 387 x 10^9/L
Hemoglobin	10,1 g/dL	11,7 - 15,3 g/dL

Hva er det viktigste tiltaket å gjøre først?

A Gi væske og blodtransfusjon da du mistenker utvikling av Dengue hemoragisk feber
B Gi trombocytt transfusjon for å hindre blødninger
C X Gi artesunat eller kinin da du mistenker malign malaria
Sykehistorie og funn er forenelige med alvorlig falciparummalaria som utvikler seg raskt og har høy dødelighet. Sepsis kan ikke utelukkes, men det haster mer med å få iverksatt effektiv malariabehandling.
D Gi doxycyclin da du mistenker alvorlig rickettsiose

00001657c362545ae0

31
En 43 år gammel mann innlegges på grunn av en alvorlig infeksjon. Ved utredning finnes positiv HIV-test, og tilstanden klassifiseres etter hvert som AIDS. Ved mikroskopi av tusjpreparat av spinalvæske (1000x forstørrelse) påvises store runde celler med svært stor kapsel (se bildet nedenfor). Antigentest i spinalvæske for det aktuelle agens er dessuten positiv.
Hvilket mikrobiologisk agens er dette?



A Herpes simplex virus
For liten til å ses med lysmikroskopi
B Neisseria meningitidis
Bønneformet diplokokk
C Haemophilus influenzae
Stavbakterie
D X Cryptococcus neoformans
Det er økt risiko for cryptokokkmeningitt ved AIDS, tusjpreparat benyttes for påvisning av den store kapselen, antigentest er mer sensitiv enn mikroskopi.

00001657c362545ae0

32
En 78 år gammel mann har permanent kateter på grunn av urinretensjon. Han venter på prostatainngrep. En natt våkner han med feber, er kvalm og kaster opp, men er klar og orientert. Temperatur 39,1°C, puls 85/min, BT 110/75 mmHg, respirasjonsfrekvens 18. Urinstix +++ på leukocytter, negativ på nitritt.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Cystitt
B Urosepsis
C Akutt prostatitt
D X Øvre urinveisinfeksjon
Kliniske opplysninger er forenelig med urinveisinfeksjon. Sepsiskriterinene er ikke til stede. Allmennsymptomer som feber, kvalme og oppkast er forenelig med øvre urinveisinfeksjon.

00001657c362545ae0

33
En 45 år gammel mann kommer tilbake fra Sør-Afrika hvor han har vært på safari. En uke etter hjemkomst får han feber (39.5°C), et makulopapuløst utslett og hovne lymfeknuter i lysken. Han sier han fikk flere flåttbitt, og legen finner flere lesjoner med svarte kruster etter sannsynlig flåttbitt på beina.
Hvilken diagnose er mest nærliggende?

A Denguefeber
B X Rickettsia-infeksjon
Rickettsioser er gram-negative bakterier som overføres med flåttbitt. Flåttbittene gir typiske svarte kruster (eschar). Symptomene er ofte feber, utslett og hovne lymfeknuter. Sykdommen opptrer ofte etter reiser til Afrika og Asia, og særlig i forbindelse med safari og reiser ut av byene.
C Tyfoidfeber
D Malaria

00001657c362545ae0

34
En 24 år gammel frisk kvinne med sørøst-asiatisk etnisitet er gravid for første gang i uke 12. Svangerskapet er ukomplisert. I en blodprøve ble det målt B-HbA1c på 38 mmol/mol (referanseområde: 28 - 40 mmol/mol).
Hvordan bør kvinnen følges opp videre?

A Hun bør få utført glukosebelastning så snart som mulig
Nei, det anbefales ikke
B X Hun bør fortsette å følge vanlige svangerskapskontroller
Ja, det er korrekt, ref https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes/dokumenter-svangerskapsdiabetes/Oversiktsalgoritme%20svangerskapsdiabetes.pdf/_/attachment/inline/46c25cdb-8f70-4a35-ae19-5512cc35c6b5:3ea29233db4f37719622a47ac962e82a7b9fea94/Oversiktsalgoritme%20svangerskapsdiabetes.pdf
C Hun bør kontrolleres hyppigere (ca. hver 2. uke) inkludert gjentatte målinger av HbA1c
Nei, det anbefales ikke
D Hun bør henvises snarlig til svangerskapspoliklinikk
Nei, det anbefales ikke

00001657c362545ae0

35
Hvilken biokjemisk analyse egner seg best for å utelukke at pasienten har primær hypotyreose?

A X Tyreoideastimulerende hormon (TSH) i serum
mest sensitiv, derfor best egnet
B Antistoff mot tyreoidperoksidase (anti-TPO) i serum
Uegnet
C Fritt tyroksin (fritt T4) i serum
Lite sensitiv, derfor mindre egnet
D Fritt trijodtyronin (fritt T3) i serum
Uegnet

00001657c362545ae0

36
Mikrobiologisk laboratorium bruker antibiotika følsomhetsbestemmelse og screeningmetoder for å detektere resistensmekanismer hos bakterier. Ett eksempel på en slik resistensmekanisme er produksjon av betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL).
Hvilket resultat på en antibiotika følsomhetsbestemmelse gir mistanke om at bakterien er ESBL-produserende?

A Resistens mot ampicillin og penicillin hos Enterobacterales
B X Resistens mot tredjegenerasjons cefalosporiner hos Enterobacterales
ESBL er betalaktamaser med utvidet spektrum som produseres av en del gram negative staver inkludert Enterobacterales og det må foreligge resistent mot tredje generasjons cefalosporiner for å misenke ESBL.
C Resistens mot ampicillin og gentamicin hos Enterobacterales
D Resistens mot tredjegenerasjons cefalosporiner hos Staphylococcus aureus

00001657c362545ae0

37
Du er tilsynslege på et sykehjem og blir oppringt av en sykepleier derfra. Personalet har observert mørk grumsete urin i urinkateterposen hos en 83 år gammel kvinne som har permanent urinkateter. Hun klager ikke over smerter eller andre plager. Hun har ikke feber. CRP <5. Sykepleieren har tatt en urinstrimmelprøve (u-stix) som var positiv på nitritt og sendte deretter inn urinprøve tatt fra posen til bakteriologisk dyrkning. Posen ble sist tømt 8 timer før prøvetakingen. Svaret på prøven er kommet og viser:
Vekst av 1000 (10^3) CFU/ml Enterococcus faecalis
Hvordan bør du håndtere dette videre?

A Ber sykepleieren skifte urinkateter og ta ny urinprøve til bakteriologisk dyrkning
B Ber sykepleieren henge opp intravenøs væske fordi mørk urin tyder på dehydrering
C X Undersøker pasienten for mulige årsaker til mørk og grumsete urin
Permanent urinkater blir alltid kolonisert med bakterier. Urin er et godt vekstmedium for bakterier, og urin i urinposen kan inneholde høy konsentrasjon av bakterier. Det blir derfor svært vanskelig å tolke betydningen av dette funnet. Dersom det foreligger indikasjon for bakteriologisk dyrkning av urin hos en person med permanent urinkateter skal den ikke tas fra pose (og helst tas ved kateterskifte). Du har ikke fått noen opplysninger som tilsier at det er indikasjon for mikrobiologisk prøvetaking. Du bør derfor starte med å undersøke hva som kan være årsakene til endringen i urinen. Du får da også vurdert om det foreligger indikasjon for prøvetaking. Det kan godt være riktig at pasienten behøver væske men du har foreløpig litt lite informasjon til å vurdere dette.
D Starter opp antibiotikabehandling på grunn av signifikant vekst av urinpatogen bakterie

00001657c362545ae0

38
Du jobber på et fastlegekontor og får inn en 28 år gammel gravid kvinne til første svangerskapskontroll. Hun har hatt hyppig urinveisinfeksjon før graviditeten så du velger å ta en urinprøve til bakteriologisk dyrkning for screening av asymptomatisk bakteriuri. Du mottar følgende svar to dager senere:
Vekst av 100000 (10^5) CFU/ml Enterococcus faecalis.
Hvordan bør du håndtere denne pasienten videre?

A Du ber pasienten ta kontakt dersom hun får symptomer
B Du starter antibiotikabehandling for Enterococcus faecalis
C X Du ber henne ta en ny urinprøve til bakteriologisk dyrkning om to uker
Se siste kommentar
D Du ber henne ta en ny urinprøve til bakteriologisk dyrkning samme dag
Gravide kvinner med økt risiko for urinveisinfeksjon screenes gjerne for asymptomatisk bakteriuri som skal behandles dersom det påvises. Andre pasientgrupper skal ikke behandles for asymptomatisk bakteriuri. Asymptomatisk bakteriuri forutsetter funn av samme bakterie i mengde ≥ 10^5 CFU/ml i to urinprøver tatt med to ukers mellomrom. Hun bør også ta kontakt ved symptomer på UVI, dette gjelder uavhengig av aktuelle funn.

00001657c362545ae0

39
Du jobber på et fastlegekontor og får inn en 78 år gammel kvinne med symptomer på cystitt. Pasienten tar selv en midtstrøms urinprøve som du sender til laboratoriet for bakteriologisk dyrkning. Du starter behandling med pivmecillinam (Selexid). Neste dag får du følgende svar på urinprøven:
Vekst av 1000 (10^3) CFU/ml Enterobacter cloacae og 100 (10^2) Enterococcus faecium
Hvordan skal du tolke dette funnet?

A Signifikant vekst av Enterobacter cloacae og Enterococcus faecium
B Signifikant vekst Enterobacter cloacae og ikke signifikant vekst av Enterococcus faecium
C X Ikke signifikant vekst av Enterobacter cloacae og Enterococcus faecium
Vekst av flere bakterier tyder på kontaminasjon av prøven. Både Enterobacter cloacae og Enterococcus faecium er sekundærpatogene bakterier i urin. Vekst av ≥ 1000 (10^3) CFU/ml regnes som signifikant vekst ved renkultur av både primær- og sekundærpatogene bakterier. Ved vekst av flere ulike mikrober i en midtstrøms urinprøve kreves et større antall CFU/ml (≥ 10^4) for både primær- og sekundærpatogene bakterier for at veksten skal regnes som signifikant.
D Signifikant vekst av Enterococcus faecium og ikke signifikant vekst av Enterobacter cloacae

00001657c362545ae0

40
64 år gammel mann med diabetes mellitus type 2, hypertensjon og hjertesvikt legges inn pga dyspnoe og økende deklive ødemer.
I mottak BT 140/90. Urin stix: albumin 4+. O2 Sat 91%. Knatring basalt begge lunger.

Du mistenker at pas har et nefrotisk syndrom. Hvilken av følgende prøver er det viktigst å få besvart før henvisning til nyrelege?

A X Albumin/kreatinin ratio i urin
Forhøyet albumin/kreatinin ratio i urinen er tegn på nefrogent tap av albumin
B s-kreatinin
C s-kolesterol
D s-albumin

00001657c362545ae0

41
Når man starter behandling med en angiotesin converting enzyme hemmer (ACEi) så vil man få flere endringer i hormonnivåene.
Hvilke endringer vil skje i løpet av noen dager etter oppstart?

A Renin forblir uendret og Aldosteron synker
B X Renin øker og Aldosteron synker
ACEi hemmer dannelsen av Angiotensin2 og dermed synker også Aldosteronproduksjonen. Dette gjør at den negative feedback som aldosteron har på renin svekkes, og dermed vil renin øke.
C Renin synker og Aldosteron øker
D Renin synker og Aldosteron synker

00001657c362545ae0

42
Mann 70 år gammel med kronisk nyreskade stadium III, han bruker ACE hemmere pga hypertensjon. Han blir lagt inn i akuttmottaket pga slapphet og høg feber, mistenker akutt øvre luftvegsinfeksjon. Han har fått i seg lite mat og drikke. BT 114/72.
Blodprøver viser relativt uendra nyrefunksjon med eGFR på 35 ml/min, men kalium på 6.9 (ref. 3,5-4,4) og moderat acidose med pH 7,26 (ref. 7,15-7,30) og bikarbonat 17 (ref. 15-20). EKG viser sinusrytme og spisse T-takker.
ACE hemmere blir nulla.
Kva tiltak er viktigast å starte først?

A X Glukose- og insulininfusjon
Viktigst å starte med en gang, gir væsketilførsel samtidig som det gir rask korreksjon av kalium
B Dialyse
Ikke indikasjon for å starte dialyse først, uendret nyrefunksjon, er ikke overhydret, og vil i tillegg ta for lang tid å etablere
C Acidosekorreksjon med i.v. bikarbonat
RIktig å korrigere acidose ved hyperkalemi, men dette tiltaket vil korrigere hyperkalemi over lengre tid, ikkje egna til rask korreksjon av hyperkalemi.
D Diuretika
Ikke indikajson for, han er sannsynligvis dehydrert

00001657c362545ae0

43

En 32 år gammel kvinne er tidligere stort sett frisk og bruker ingen faste medisiner, men har brukt en del NSAID den siste måneden pga en kneskade. For en uke siden utviklet hun et utslett på ryggen. Hun selv mistenkte at det kunne være bivirkning av NSAID, og sluttet derfor straks med medikamentet. Utslettet er nå i bedring, men ved kontroll hos fastlegen en uke senere påvises nedsatt nyrefunksjon med kreatinin 358 µmol/l (ref.45-90) og urin stix: protein 1+, leukocytt 1+ (ref. neg), ellers neg.

Hva er sannsynlige årsak til nedsatt nyrefuksjon?

A Rapid forløpende glomerulonefritt
Her ville man forventet betydelig hematuri, evt. proteinuri og sykehistorien er ikke typisk
B Minimal change nefropati
Oftest er GFR normal, men gir som regel nefrotisk syndrom
C IgA-nefropati
Her ville man forventet betydelig hematuri og evt. proteinuri. Sykehistorien er heller ikke typisk
D X Interstitiell nefritt
Sykehistorie med inntak av NSAID noen uker i forveien, utslett og relativt sparsomme funn på urinstix er typisk

---

00001657c362545ae0

44
56 år gammel kvinne som fikk biopsi verifisert mesangioproliferativ glomerulonefritt for 10 år siden. Hun har hele tiden hatt mikroskopisk hematuri, +B i morgenurin. Ved kontroller har hun normal nyrefunksjon. Albumin/kreatinin ratio 18-22 mg/mmol (<2,5 mg/mmol) målt i 3 ulike morgenurinprøver. BT 150/86. Lett overvekt, BMI 29.
Hvilket tiltak er det beste?

A Starte behandling med en kalsiumantagonist.
B X Starte behandling med ACE hemmer eller A2 blokker
Best med tanke på reduksjon av albuminuri
C Anbefale vektreduksjon
D Ta henne tilbake til kontroll om 3 måneder

00001657c362545ae0

45
En 76 år gammel mann har hatt progredierende kronisk nyresykdom over flere år. Han er hos fastlegen og lurer på hva som avgjør når han må starte med dialyse.
Hva bør fastlegen informere om?

A Dialyse avventes inntil pasienten slutter å produsere urin
Oppstart av dialyse hos pas. med KNS bør planlegges i god tid med valg av modalitet og forberedelse av tilgang. Akutt dialyse hos disse pasientene bør unngås.
B Dialyse iverksettes når eGFR faller < 15 ml/min/1,73
C Dialyse iverksettes når s-kalium er > 6 mmol/l
Ikke nødvendigvis, ofte kommer man til mål ved medikamentell behandling
D X Dialyse avventes til pasienten får symptomer på uremi, oftest ved GFR < 10
Riktig svar. Tidspunkt for dialyse vurderes individuelt og vil ofte være ved uremiske symptom, eller ved vanskelig behandelbar alvorlig hyperkalemi, ascidose eller overhydrering. Oftest vil pas. ha GFR < 10.

00001657c362545ae0

46
En 80 år gammel kvinne som bor hjemme sammen med ektefellen kommer til fastlegen for kontroll av sin hypertensjon. Blodtrykksmedisin har vært gradvis trappet opp med ACE-hemmer, kalsiumantagonist og ved siste konsultasjon med thiazid. Hun føler seg i fin form, men er litt mer glemsk enn tidligere. BT 135/84, p 78, ingen ødem.

	Resultat	Ref.omr.
Kreatinin (µmol/l)	53	45-90
Na (mmol/l)	131	137-245
K (mmol/l)	4,0	3,6-4,6

Hvordan bør hennes hyponatremi håndteres?

A X Seponere thiazid og kontrollere Na om 1-2 uker
Riktig svar. Thiazider kan gi hyponatremi, reversibelt. Milde symptomer (glemsk) og moderat hyponatremi.
B Legge henne inn på sykehus til utredning av hyponatremi og korreksjon
C Mild hyponatremi, ingen tiltak nødvendig
Ettersom hun muligvis har symptomer (kognitiv funksjon) bør man forsøke å reversere
D Væskerestriksjon og salttabletter, kontroll Na om 1-2 uker

00001657c362545ae0

47
En 75 år gammel mann innlegges pga alvorlig hypertensjon. BT er ca 220/125 ved gjentatte målinger på sengepost. Han har vært dårlig i flere uker, og har nå hatt dyspnoe de siste nettene, av og til også noe press over brystet. Ved auskultasjon er det normale forhold bilateralt. Ved oftalmoskopi er det tydelig øyebunnsforandringer (blødninger og bomullseksudater). Han har uendret syn.
Hvilken behandling bør legen starte?

A X Alfa- og betablokker-infusjon (eks Trandate) og furosemid 20-40 mg x 2-3 i.v.
Alvorlig hypertensjon med mulig hjertesvikt og kanskje ustabil angina: trykket må senkes en god del og iv trandate gjør dette effektivt og er bra ved coronar ischemi. Muligens også noe overvæsket men uten at det foreligger lungeødem. Derfor også behov for diuretika. Nitro-drypp er trolig ikke nødvendig da det ikke er noe klinisk lungeødem. CCB og ACEi po blir for langsom og usikker effekt.
B Loop-diuretikum (eks Furosemid 20-40 mg x 2-3) i.v.
C Kalsiumblokker (eks Amlodipin 5 mg x 1) p.o. kombinert med loop-diuretikum (eks Furix 20 mg x 2) p.o
D ACE hemmer i middels - høy dose (eks Lisinopril 10 mg x 1) og lavdose tiazid (eks hydroklortiazid 12.5 mg) p.o.

00001657c362545ae0

48
En 50 år gammel kvinne med kronisk nyresvikt pga kronisk glomerulonefritt har eGFR 42 ml/min (ref. ≥90). Hennes BT er velkontrollert, hun bruker statin og har kolesterolverdier innen ønsket område. Hun er bekymret for at hennes kroniske nyresykdom vil øke faren for fremtidig hjerte/karsykdom

Hva er det riktig å informere henne om?

A X Kronisk nyresykdom er assosiert med økt kardiovaskulær risiko.
Økt forekomst av kardiovaskulære hendelser selv med god behandling av de tradisjonelle risikofaktorer vi kjenner.
B Risikoen for kardiovaskulær sykdom er eliminert pga god blodtrykks- og kolesterolsenkende behandling.
C Kronisk nyresykdom gir økt risiko for kardiovaskulær sykdom først i senere stadium, når GFR faller under 30.
D Risikoen for kardiovaskulær sykdom er ikke betydelig økt så lenge hun ikke er overhydrert.

00001657c362545ae0

49
En 58 år gammel mann med hypertensjon og nedsatt nyrefunksjon, eGFR 40 (ref ≥ 90) kommer til kontroll på fastlegekontoret. BT er 145/75, u-albumin/kreatinin ratio er 98 mg/mmol (ref. < 3). Han er overvektig med BMI 35. Han bruker ACE-hemmer Lisinopril 5 mg x 1, kalsiumblokker Amlodipin 10 mg, statin og acetylsalisylsyre.
Hva er viktigste tiltak for å bremse progresjon av nyresykdommen?

A X Øke dosen ACE-hemmer så mye som mulig innenfor akseptabelt blodtrykk og bivirkninger for å redusere albuminurien
Riktig svar. Dette er best dokumenterte tiltak
B Legge til en SGLT2-hemmer
Medikamentet har nyrebeskyttende effekt, men først skal man optimalisere dosen av RAS-blokade
C Skifte fra ACE-hemmer til Angiotensin 2-blokker for å redusere albuminurien mer effektivt
Ikke påvist mer effektiv med ARB, men viktig å øke dose til meksimalt tolererte/anbefalte dose
D Oppfordre pasienten til vektnedgang til BMI < 30
Viktig tiltak, men mindre effekt på nyresykdom

00001657c362545ae0

50
Hvilken av følgende infeksjonssykdommer kan forårsake medfødte misdannelser i øye, øre, hjerte og CNS dersom mor blir infisert i tidlig svangerskap?

A HIV
Gir ikke fostermisdannelser
B X Rubella
Korrekt svar
C Hepatitt B
Gir ikke fostermisdannelser
D Zikavirus
Kan gi mikrocephali

00001657c362545ae0

51
I Norge har vi ikke rutinemessig ultralyd i 3. trimester. Det er mange gode kliniske indikasjoner for ultralyd i 3. trimester. Hvilken av disse er en indikasjon for ultralyd i 3. trimester?

A Gjennomgang av fosteranatomien
B Vurdere risiko for akutt keisersnitt med transperineal ultralyd
C X Mistanke om seteleie
Fosterleie skal vurderes i svangerskaps uke 36 og den gravide skal henvises til ultralyd ved mistanke om seteleie. Screening av preeklampsi kan bare gjøres i første trimester og ikke i tredje trimester. Gjennomgang av anatomien gjøres ved rutine ultralyd i andre trimester. Transperineal ultralyd gjøres oftest i forbindelse med fødsel.
D Screening for preeklampsi

00001657c362545ae0

52
Undersøkelse av fosterhjerte er en viktig del av rutineultralydundersøkelsen i andre trimester. Noen fostre har hjertefeil og det er viktig at disse oppdages. Særlig er det viktig å oppdage de hjertefeilene som er avhengige av at ductus arteriosus er åpen, såkalte ductusavhengige hjertefeil. Hvorfor det?

A Disse fostrene må forløses ved et universitetssykehus slik at de kan følges tett etter fødselen
B Disse hjertefeilene er så alvorlige at foreldrene stort sett velger svangerskapsavbrudd
C Disse hjertefeilene kan behandles intrauterint hvis de oppdages i tide
D X Disse fostrene må forløses ved Rikshospitalet fordi de trenger hjertekirurgi kort tid etter fødselen
Ductus avhengige hjertefeil må forløses ved Rikshospitalet fordi disse trenger alle kirurgi kort tid etter fødselen. Hjertekirurgi på nyfødte er sentralisert dit. Flere av disse hjertefeilene kan opereres og disse barna får normalt funksjonelle hjerter etterpå og det er derfor ikke det om hjertefeilen er ductus avhengig som for forelderen er viktig når et valg om svangerskapsavbrudd tas, men om barna blir friske etter kirurgi. Intrauterin behandling er ikke en mulighet.

00001657c362545ae0

53
I hvilken del av svangerskapet tilsvarer symfyse-fundus (SF) målet i cm omtrent antall uker?

A 34-40 uker
Mindre grad av samsvar mot slutten av svangerskapet
B 12-20 uker
SF mål er vanskelig å måle før halvgått svangerskap
C X 20-34 uker
fra 20-34 uker tilsvarer SF målet antall uker - 2, dvs omtrent det samme som antall ukers svangerskapslengde
D 8-12 uker
Livmoren ligger i det lille bekken og er ikke palpabel fra abdomen

---

00001657c362545ae0

54
Tidlig innsettende og alvorlig preeklampsi er assosiert med

A Påvirket blodstrøm i arteria arcuata (høy PI med notch)
Vi kan ikke gjøre Doppler ultralyd av a. arcuata. Vi må lenger ut på hovedstammen til uterus (arteria uterina på begge sider)
B X Ufullstendig trofoblastinvasjon av spiralarterier
Korrekt svar
C Påvirket blodstrøm i vena umbilicalis (høy PI med notch)
Vi gjør Doppler av arteria umbilicalis - ikke vena umbilicalis. Blodstrømmen kan være påvirket i arteria umbilicalis ved alvorlig preeklampsi. Umbilikalvenen har ikke pulsatilt mønster og har derfor verken høy PI eller notch
D Ufullstendig syncytiotrofoblastinvasjon av placenta villi
Det er ikke syncytiotrofoblaster som invaderer - og ikke planta villi

---

00001657c362545ae0

55
Ultralyd under fødsel kan brukes til å få informasjon om fremgangen i fødselen. Hvilken påstand er sann?

A Ultralyd under fødsel er den tryggeste metoden som gir mest informasjon om fremgangen i fødselen
B Ultralyd under fødsel må alltid brukes før man bestemmer seg for at keisersnitt er det riktige valget når det er langsom fremgang i andre stadium
C Ultralyd under fødsel brukes for å estimere fostervekt før man utfører en vakuumforløsning når det er langsom fremgang i andre stadium i fødselen
D X Ultralyd under fødsel kan brukes for å trygge fødselsleger om at vakuum forløsning kan være trygg mulighet
Studier har vist at ultralyd kan brukes for å trygge fødselsleger i at en vakuum forløsning kan være en trygg mulighet ved langsom fremgang i andre stadium. Ultralyd gir en del informasjon med det er ikke vist at det er den tryggeste metoden for å få informasjon fremgang i fødselen. Det er ikke slik at man alltid må bruke ultralyd før man gjør keisersnitt, men metoden kan gi tilleggsinformasjon. Estimering av fostervekt gjøres ikke i fødselens andre stadium.

00001657c362545ae0

56
Hvilke(n) blodprøve(r) er anbefalt ved første svangerskapskontroll?

A X Gravide bør få tilbud om blodprøve for ABO/RhD-typing og undersøkelse for blodtypeantistoff i første trimester
ifølge Nasjonal retningslinjer fra HDir.
B Gravide bør få tilbud om måling av toxoplasmose status i første trimester
C Ingen blodprøver er nødvendig i første trimester
D Gravide bør få tilbud om å måle HbA1c i første trimester

00001657c362545ae0

57
Du har tatt imot et barn etter en normal vaginal fødsel. Etter 1 minutt gjør du følgende observasjoner: Hjertefrekvens 110 bpm, ingen egenrespirasjon, hudfarge blek-blå, redusert muskeltonus, men ikke helt slapp, ingen reaksjon ved stimulering. Du tørker, stimulerer og ventilerer med bag og maske. Etter 5 minutter gjør du følgende observasjoner: Hjertefrekvens 120 bpm, litt pressende egenrespirasjon, hudfarge blå på ekstremitetene/rosa sentralt, redusert muskeltonus, men reagerer fint ved stimulering. Hvordan skal dette bedømmes?



A Apgarscore er 3 etter 1 minutt og 9 etter 5 minutter. Det er ingen mistanke om fødselsasfyksi.
Feil, fordi Apgarscore er 3-7.
B Apgarscore er 2 etter 1 minutt og 6 etter 5 minutter. Det er mistanke om fødselsasfyksi.
Feil, fordi Apgarscore er 3-7.
C X Apgarscore er 3 etter 1 minutt og 7 etter 5 minutter. Det er ingen mistanke om fødselsasfyksi.
Korrekt. Apgarscore >6 etter 5 min gir ikke mistanke om fødselsasfyksi.
D Apgarscore er 4 etter 1 minutt og 5 etter 5 minutter. Det er mistanke om fødselsasfyksi.
Feil, fordi Apgarscore er 3-7.

00001657c362545ae0

58
Helle føder sitt første barn, og fødselen blir overvåket med CTG-registrering. I åpningsfasen viser registreringen fosterlyd med basalfrekvens 120 slag/min, slagvariabilitet på 10 slag/min og flere akselerasjoner.
Hvordan vil du beskrive denne CTG-registreringen?

A X Normal
B Patologisk pga. flere akselerasjoner
C Patologisk pga. basalfrekvens på 120 slag/min
D Avvikende pga. slagvariabilitet på 10 slag/min

00001657c362545ae0

59
Du er nyansatt lege ved fødeavdelingen. Bakvakten står og opererer. Eva innkommer i begynnende fødsel, og det foreligger DCDA (dikoriote-diamniote) tvillinger i uke 38. Tvilling 1 er i hodeleie, tvilling 2 er i seteleie. Svangerskapet er normalt, tvillingene er normalt store og det er ingen tegn til preeklampsi.
Hva skal være legens anbefaling til Eva?

A Du anbefaler keisersnitt fordi det er risiko for tvillingkollisjon under fødsel
Feil, fordi tvillingkollisjon kan bare forekomme ved sete (tvilling 1) og hode (tvilling 2)
B Du anbefaler keisersnitt fordi det er risiko for tvilling-tvilling-transfusjon under fødsel
Feil, fordi DCDA tvillinger kan ikke få TTS
C Du anbefaler normal vaginal fødsel (jordmorstyrt uten spesiell overvåkning)
Feil, fordi tvillingfødsler er høyrisikofødsler som skal overvåkes. Jordmor kan gjerne lede fødselen, men lege skal være tilstede under trykketiden.
D X Du anbefaler normal vaginal fødsel med CTG-overvåkning og ultralyd
Korrekt

00001657c362545ae0

60
En tredjegangsfødende kvinne er to ganger tidligere forløst med keisersnitt. Hva har hun dermed økt risiko for?

A Overtidlig svangerskap
B Seteleie
C Prematur fødsel
D X Placenta accreta
Økt risiko for at trofoblastene vokser inn i sectioarret og leder til placenta accreta.

00001657c362545ae0

61
En ung kvinne oppsøker deg som fastlege. Hun fødte sitt 3. barn for 2 måneder siden. Hun hadde kostregulert svangerskapsdiabetes, ellers ukomplisert graviditet og fødsel.
Hva er mest riktig oppfølging av denne kvinnen?

A Ber henne komme tilbake for å ta en p-glukose prøve
Feil. Det fanger ikke opp en evt T2D.
B Sender henvisning til endokrinologisk poliklinikk ved nærmeste sykehus
Feil. Disse pasienter skal ikke følges opp på endokriniologisk avdeling i første omgang.
C X Ber henne komme tilbake for å ta HbA1c om 2 måneder
Riktig. Det er dette som er anbefalt for å avdekke T2D hos de som har hatt svagerskapsdiabetes.
D Ber henne føre blodsukkerdagbok og tar henne til kontroll om en uke
Ikke riktig. Det skal en standardisert test til for å avdekke en evt T2D.

00001657c362545ae0

62
En 50 år gammel kvinne blir etter utredning operert for brystkreft. I den endelige patologirapporten er det informasjon som gir en pekepinn både om prognose og hvilken behandling pasienten skal motta. Hvilke biomarkører rapporteres rutinemessig av patologen?

A Østrogenreseptor, progesteronreseptor, og Ki67
B Østrogenreseptor, progesteronreseptor og HER2
C Østrogenreseptor, androgenreseptor, HER2 og Ki67
D X Østrogenreseptor, progesteronreseptor, HER2 og Ki67
Disse fire markørerne er både prognostiske og prediktive faktorer i brystkreft

---
00001657c362545ae0

63
En 8 år gammel gutt ble lagt inn med magesmerter og petekkier. Etter hvert utviklet han et blandet nefrotisk og nefrittisk bilde, og det var mikroskopisk hematuri.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Membranøs nefropati
B Halvmånenefritt
C "Minimal change" nefropati
D X IgA-nefropati
Barnet hadde mest sanns. Henoch-Schönlein purpura som hos barn kan gi en IgA-nefropati med som oftest god prognose.

00001657c362545ae0

64
Omtrent 300 tilfeller av testiscancer oppstår i Norge hvert år. Av disse er omtrent halvparten seminomer.
Hva ser man vanligvis ved mikroskopisk undersøkelse av et histologisk snitt fra en testis med seminom?

A Områder med cystisk degenerasjon, andre med blødning, samt solide områder med atypiske tumorceller
Denne beskrivelsen er forenlig med flere cancertyper, best forenlig med en non-seminom germinalcelletumor, choriocarcinom, men ikke med seminom.
B Knuter bestående av epitelioide celler, tallrike lymfocytter og flerkjernede kjempeceller
Denne beskrivelsen er best forenlig med granulomatøs betennelse.
C Ulike typer modent vev som for eksempel hud med hudadneksstrukturer, respiratorisk epitel og nevralt vev
Denne beskrivelsen er best forenlig med teratom.
D X Ensartede, polygonale celler med rikelig cytoplasma og sentrale nuklei, lymfocytter og fibrøse bånd
Atypiske germinalceller, lymfocytter og fibrose er det typiske histopatologiske bilde av seminom

---

00001657c362545ae0

65
En 38 år gammel kvinne gjennomgår kirurgisk reseksjon av en øm tumor i det venstre brystet. Hun har et 12 måneder gammelt barn og opplyser også om at hennes mor og tante begge fikk brystkreft før de fylte 50 år.
Bildene viser et hematoxylin-erythrosin-safran (HES)-farget histologisk snitt fra operasjonspreparatet.
Bilde A: Lav forstørrelse. Bilde B: Høy forstørrelse.
Hvilken diagnose passer best med funnene på bildene?


A


B

A X Kjertelvev med laktasjonsforandringer
Riktig svar

B Metastase fra malignt melanom.
Svaret er feil. Det er riktig at melanom kan ha store, tydelige nukleoler, men her er de et uttrykk for høy fysiologisk aktivitet. Dessuten viser bildene normale kjertelendestykker og gangstrukturer med hyperplasi forenlig med laktasjonsforandringer, ikke atypi.

C Duktalt karsinom in situ.
Feil svar. Selv om det er mye aktivitet i epitelet med tydelige nukleoler i de runde kjernene, er det ingen atypi. Kjertelstrukturene er bevarte, men utvidede. Cellene produserer et lipidrikt materiale – melk.

D Infiltrerende karsinom.
Feil svar. Bildet viserhyperplastisk kjertelvev med høy aktivitet forenlig med laktasjonsforandringer.

00001657c362545ae0

66

En 31 år gammel kvinne utredes grunnet dysmenore og infertilitet. Ved gynekologisk undersøkelse er det normale funn bortsett fra litt væske i Fossa Douglasi som påvises ved vaginal ultralyd. Ved diagnostisk laparoskopi ses blåsvarte cyster og plakk på overflaten av høyre ovarium. Det blir tatt en vevsprøve, og bilde av biopsien ser du under (Hematoksylin og eosinfarget snitt på 200 X forstørrelse). Hva er mest sannsynlige diagnose?



A Ovarialfollikler
Feil svar: Ovarialfollikler er kledt i ensartede granulosaceller som ligger i flere lag. Har ikke omgivende cytogent stroma. Gir ingen symptomer.

B X Endometriose
Riktig svar: Vevsprøve fra endometriosefoci viser endometrioide kjertler kledt i et epitel uten atypi som er omgitt av cytogent stroma med fersk og/eller gammel blødning. Kan være asymptomatiske, men har ofte symptomer i form av dysmenore, dyspareuni, bekkensmerter og infertilitet.

C Adenokarsinom
Feil svar: Ved adenokarsinom sees tettligende kjertler kledt i et atypisk epitel. De er ikke omgitt av cytogent stroma og er sjeldne i så tidlig alder.

D Inklusjonscyster
Feil svar: Enkle cyster kledt i tubelignende epitel. Mangler cytogent stroma og er i liten grad ledsaget av fersk eller gammel blødning. Gir vanligvis ingen symptomer.

00001657c362545ae0

67
Hva er verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon av neonatal mortalitet?

A Dødsfall innen de første 10 dagene etter fødsel blant levendefødte.
B X Dødsfall innen de første 4 ukene etter fødsel blant levendefødte.
C Dødsfall innen første uke etter fødsel blant levendefødte.
D Dødsfall innen de første 24 timene etter fødsel pluss de dødfødte.

00001657c362545ae0

68
Hvilke fire hovedgrupper deles svulster i ovariet inn i?

A Epiteliale svulster, germinalcellesvulster, fibromer, metastaser
B Epiteliale tumorer, metastaser, germinalcellesvulster, granulosacellesvulster
C Sex cord-stromale tumorer, germinalcellesvulster, karsinomer, metastaser
D X Germinalcellesvulster, epiteliale svulster, sex cord-stromale svulster, metastaser
Riktig svar er germinalcellesvulster, epiteliale svulster, sex cord-stromale svulster, og metastaser. Granulosacellesvulster og fibromer er eksempler på en sex cord-stromale svulster, og karsinomer er et eksempel på en epitelial svulst.

00001657c362545ae0

69
En 70 år gammel mann oppsøker sin fastlege pga. hyppig vannlating som blant annet går utover nattesøvnen. Ved palpasjon finner fastlegen en noe asymmetrisk forstørret prostata. Pasienten blir etter videre utredning senere operert med transuretral reseksjon av prostata. Mikroskopisk beskrivelse av prostatavevet er som følger: Prostatavevet er overveiende inndelt i knuter (noduler). I nodulene er det hyperplasi av kjertler og stroma. I kanten av to av vevsbitene er det små foci med små, dels sammenflytende kjertler kledd av epitel med lett vekslende kjernestørrelse. Immunhistokjemisk undersøkelse viser at det ikke er myoepitel omkring de små kjertlene.
Hva er mest sannsynlige diagnose(r)?

A Normalt prostatavev og benign prostatahyperplasi.
B X Benign prostatahyperplasi og adenokarsinom.
Benign prostatahyperplasi kjennetegnes av knutete prostatavev (noduler) og hyperplasi av både kjertler og stroma. Små, sammensmeltede kjertler som mangler omgivende myoepitel tyder på adenokarsinom.
C Kjertelatrofi og benign prostatahyperplasi.
D Normalt prostatavev og adenokarsinom.

00001657c362545ae0

70
En 30 år gammel kvinne utredes for infertilitet. Hun har uregelmessige menstruasjoner (oligomenore) og nevner at hun har gått opp i vekt, har hodepine, og i det siste har merket et sekret fra begge brystvortene.
Hvilken diagnose er den mest sannsynlige?

A X Hypofyseadenom
Riktig svar. Symptomene hennes kan passe med et hormonproduserende adenom, mest sannsynlig prolaktinom: et prolactin-produserernde hypofyseadenom
B Binyrebarkadenom
Feil svar. En kortisol-produserende binyrebarkadenom kan forårsake vektøkning, men vil ikke kunne forklare hennes oligomenore og sekretet fra brystene.
C Feokromocytom
Feil svar. Feokromocytom fører til økt utskillelse av hormoner som regulerer blodtrykk. Det kan lede til hodepine, men ikke til tap av menstruasjoner og sekresjon fra brystene.
D Meningeom
Feil svar. Meningeom kan gi hodepine, men fører ikke til forstyrret hormonspeil.

00001657c362545ae0

71
Du er vakthavende barnelege og blir oppringt av en fastlege. Hun forteller at foreldrene tok kontakt pga. en 5 år gammel gutt som har fått mange blåmerker difust over hele kroppen, dette har tiltatt over ca 2 døgn. Foreldrene kjenner ikke til at han har skadet seg på noen måte, men beskriver gutten som svært aktiv både hjemme og i barnehagen.
Du lar gutten komme til akuttmottaket og ved undersøkelse framstår gutten som frisk. Upåfallende samspill mellom barn og foreldre. Gutten har konfluerende områder med rødblå hudforandringer som ikke avblekes med trykk, mest utbredt på armer og bein. Også noen på trunkus og nakke. På spørsmål om han har slått seg eller "noe har skjedd" svarer gutten benektende.
Hva vil du gjøre nå?

A X Du er usikker på hva dette representerer, og velger å legge inn for å få gjort en utredning med tanke på hematologi og koagulasjon.
Problemstilling som gir mistanke om underliggende medisinsk tilstand, så dette må utredes først.
B Siden gutten virker frisk får han reise hjem, men du setter ham opp til kontroll etter 2 dager for videre utredning.
C Siden gutten virker frisk får han reise hjem, samtidig som du sender en bekymringsmelding til barnevernstjenesten.
D Du oppfatter tilstanden som bekymringsfull med tanke på barnemishandling, så du velger å legge inn barnet for så å sende melding til barnevern og politi.

00001657c362545ae0

72
En 3 mnd gammel baby kommer til akuttmottaket for barn pga blødning fra munnhulen. Ved undersøkelse finner du en fersk skade i øvre leppebånd. Forøvrig ingen funn av skade eller sykdom.
Hvordan vil du håndtere dette?

A Du lar barnet reise hjem og sender bekymringmelding til barnevernstjenesten.
B Du sender barnet til ØNH-avdelingen for sutur av leppebåndet.
C X Du legger inn barnet og bestiller rtg. totalskjelett, cerebral CT og øyelegetilsyn
Svært viktig å lete etter underliggende tegn på mishandling.
D Du lar barnet reise hjem, men avtaler kontroll om ei uke.

00001657c362545ae0

73
En jente blir født ved keisersnitt i svangerskapsuke 32 på grunn av alvorlig preeklampsi hos mor. Hun skriker etter fødselen men utvikler i løpet av den første timen etter fødsel takypné (økt respirasjonsfrekvens), intercostale inndragninger og nesevingespill, og blir lagt på CPAP (continous positive airway pressure) med 40% oksygen.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til jentas respirasjonsproblemer?

A Lavt blodsukker på grunn av lite næringstilførsel etter at navlesnoren er kuttet
Lavt blodsukker vil ikke først og fremst debutere med respiratoriske symptomer
B Medfødt infeksjon og lungebetennelse med gruppe B-streptokokker p.g.a. umodent immunforsvar
Dette er også en muilig diagnose, men ikke på langt nær så hyppig forekommende som RDS
C X Respiratorisk distress syndrom (RDS) på grunn av surfaktantmangel
Dette er den vanligste årsaken til respiratorisk besvær hos premature barn
D Manglende resorpsjon av lungevæske og "våte lunger" på grunn av keisersnitt
Selv om RDS kan oppstå i kombinasjon med "våte lunger", er dette primærdiagnosen for barn født nært/på termin

---
00001657c362545ae0

74
En jente på 2 år kommer til deg som fastlege sammen med sine foreldre. De er slitne og klager over at ungen alltid er syk, hun hoster både natt og dag og det høres ut som hun har mye slim i brystet. Nå har hun sammenhengende hoste i 6 uker etter at hun fikk påvist COVID forrige måned, men har også hatt likende perioder tidligere. Hun har ikke eksem eller allergi. Hun snorker ikke og har ikke hatt ørebetennelser.
Hva er den mest sannsynlige diagnose og riktig håndtering?

A X Sannsynligvis er dette en protrahert bakteriell bronkitt, men vanskelig å vurdere mot astma og du henviser til barnelege for vurdering og prøvetaking.
Protrahert bakteriell bronkitt er den vanligste årsak til kronisk våt hoste hos førskolebarn (opptil 40% av henvisninger til barnelege for astma hos førskolebarn). Vurdering opp mot astma og andre kroniske lungeyskdommer er vanskelig og det anbefales at vurdering av antibiotika gjøres hos barnelege som også tar en prøve fra larynxaspirat, noe som er vanskelig å få til uten trening. Astma har oftest tørr hoste, tungpust og ofte hvesing/pipelyder og atopisk disposisjon. Utifra sykehistorie med våt hoste og ikke symptomer fra øvre luftvei er dette sykdom i nedre luftvei og ØNH vurdering er ikke indisert.
B Henviser til Øre Nese hals med tanke på falske mandler og kronisk rinosinusitt.
Protrahert bakteriell bronkitt er den vanligste årsak til kronisk våt hoste hos førskolebarn (opptil 40% av henvisninger til barnelege for astma hos førskolebarn). Vurdering opp mot astma og andre kroniske lungeyskdommer er vanskelig og det anbefales at vurdering av antibiotika gjøres hos barnelege som også tar en prøve fra larynxaspirat, noe som er vanskelig å få til uten trening. Astma har oftest tørr hoste, tungpust og ofte hvesing/pipelyder og atopisk disposisjon. Utifra sykehistorie med våt hoste og ikke symptomer fra øvre luftvei er dette sykdom i nedre luftvei og ØNH vurdering er ikke indisert.
C Mest sannsynlig er dette en ikke- atopisk astma. Du starter salbutamol (Ventoline)
D Sannsynligvis er dette er protrahert bakteriell bronkitt. Du tar en prøve og starter antibiotikabehandling.

00001657c362545ae0

75
Et 15 mdr gammel barn har nettopp gjennomgått vannkopper. Hun utvikler feber på nytt og sterke smerter i en arm. Ved undersøkelse på sykehuset er hun slapp og bleik og i dårlig allmenntilstand. Legen finner flere vannkoppeutslett med skorpe spredt på kropp og ekstremiteter og på venstre overarm er det et bleikrødt og diffust avgrenset erytem og sterk palpasjonsømhet.
Hvilken tilstand mistenker du?

A Staphylococcal scalded skin syndrom utløst av *S aureus*
Kan være smertefult men det er en overfladisk toksin påvirkning av huden med erytem og blemmer og det er sjeldent så dårlig allmentilstand og feber
B X Nekrotiserende fasciit utløst av gruppe A streptokokker
Nekrotiserende fasciit med GAS hos barn forekommer i etterforløpet av vannkopper og de sterke smerter og det diffuse utslett er karakteristisk
C Erysipelas (rosen) utløst av gruppe A streptokokker
Gir ikke så sterke smerter og palpasjonsømhet, og utslettet er ofte skarpt avgrenset

---
00001657c362545ae0

76
Hvilket av de følgende utsagnene om Hemophilus influenza type b (Hib) vaksinasjon i Norge er korrekt?

A Hib-vaksinen reduserer forekomst av øvre og nedre luftveisinfeksjoner hos barn
B Hib-vaksinen reduserer forekomst av Hib-infeksjoner i hele befolkningen
C Hib-vaksinen reduserer forekomst av alvorlige influensavirusinfeksjoner hos barn
D X Hib-vaksinen reduserer forekomst av invasive Hib-infeksjoner hos barn
Riktig. Hib-bakterien kan ha polysakkaridkapsel eller være kapselløs. De kapselkledde er inndelt i serotyper (a-f), og det er de som oftest er årsak til systemisk (invasiv) sykdom, mens de ikke-kapselkledde bakteriene kan gi øvre luftveisinfeksjoner. Hib-vaksinene gir immunitet mot kapselkledde Hib av type b som var den bakterietypen som hyppigst gav de alvorlige invasive infeksjonene hos barn, meningitt, sepsis og epiglotitt. Etter innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet har disse infeksjonene hos barn < 6 år nærmest forsvunnet, mens vi fortsatt kan se slike invasive infeksjoner hos voksne, spesielt eldre. Luftveisinfeksjoner hos barn skyldes hovedsakelig virusinfeksjoner, evt også ikke-kapselkledde Hib, og er ikke påvirket av vaksinen.

00001657c362545ae0

77
2 år gammel gutt, tidligere frisk, har fulgt vanlig vaksinasjonsprogram. De siste 2 dagene har han vært hjemme fra barnehagen med høy feber og halssmerter. I tillegg til feber har han nå fått et diffust småprikket utslett på kroppen som føles som «sandpapir» når legen stryker over det.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Skarlagensfeber
Riktig. Typisk sykehistorie for skarlagensfeber. Ved undersøkelse vil det i tillegg typisk sees tonsilitt med gullig belegg (halssmerter). Utslettet med småprikket «sandpapir» eller gåsehud-liknende palpasjonsfunn er svært typisk for skarlagensfeber og skiller det fra det mer konfluerende utslettet ved meslinger og det diffuse utslettet ved Kawasaki som ofte konsentreres rundt genitalia. Ved exanthema subitum (den fjerde barnesykdom) kommer utslettet alltid etter at feberen er borte, og barn med erythema infectiosum (den femte barnesykdomm) er sjelden høyfebrile.
B Erythema infectiosum
C Kawasakis sykdom
D Exanthema subitum

00001657c362545ae0

78
En gutt på 3.5 kg fødes ved keisersnitt to uker før termin. Indikasjonen for keisersnitt var fødselsangst hos mor. Svangerskapet hadde vært ukomplisert og gutten får Apgar-skår 7, 9 og 9 etter 1, 5 og 10 minutter. Etter fødselen har barnet moderate respiratoriske symptomer som tolkes som våte lunger eller transitorisk tachypne.
Hvilke spesifikke egenskaper ved pustemønsteret skal observeres hos et slikt barn?

A Inspiratorisk stridor, hvesing, cyanose og inndragninger
B Lyskepuls, hjertefrekvens, nesevingespill og farge
De to første er ikke egenskaper ved pustemønsteret og er ikke knyttet til respiratorisk distress.
C X Pustefrekvens, inndragninger, pressing og nesevingespill.
Det er disse observasjonene som spesifikt er rettet mot respirasjonsbesvær i nyfødtperioden og som har vært forelest.
D Pustefrekvens, inndragninger, hvesing, og cyanose
Pusteproblemer hos nyfødte er ikke kjennetegnet ved hvesender espirasjon (det er mer knyttet til astma). Cyanose er ikke spesifikt knyttet til respirasjonsproblemer (er like viktig ved f.eks. hjerteproblemer eller sepsis) og er heller ikke en egenskap ved pustemønsteret.

00001657c362545ae0

79
Et nyfødt barn med Rhesus-immunisering skal få utført en utskiftningstransfusjon. Mengden blod som skal skiftes er to ganger total blodvolum. Barnet veier 3,5 kg.
Hvor mye blod må du bestille?

A ca 140 ml
tilsvarer 40 ml/kg
B X ca 600 ml
Beregnet blodvolum for nyfødte er ca 85 ml/kg
C ca 460 ml
tilsvarer 65 ml/kg
D ca 350 ml
tilsvarer 50 ml/kg

00001657c362545ae0

80
En mor kommer til deg på legekontoret med sin 3 år gamle datter som hun mistenker har fått vannkopper i barnehagen. Datteren har feber 39.1, og typisk utslett i ansikt og på kroppen. Du bekrefter mors mistanke.
Hvor lenge bør jenta være hjemme fra barnehagen?

A X Hun bør være hjemme til alle blemmene har tørket inn og ingen nye dukker opp
Riktig, hun er smittsom inntil alle vesikler er blitt tørre kruster og det ikke dukker opp nye vesikler (ofte rundt 5 dager). Deretter er hun ikke smitteførende og kan gå i barnehagen selv om hun fortsatt har mange inntørkede kruster på hud og slimhinner. Selv om vannkopper oftest er en ufarlig sykdom, ønskes det ikke at vannkoppespredning skjer i en barnehage der det også kan gå barn med immunsvikt/immunsupprimerende behandling der vannkoppeinfeksjonen kan bli alvorlig.
B Hun bør være hjemme til feberen er borte, men kan gå i barnehagen med utslett
C Hun bør være hjemme til allmenntilstanden er bra, men utslettet trenger ikke være borte
D Hun bør være hjemme til alle spor av vannkopper er borte fra hud og slimhinner

---

00001657c362545ae0

81
En 6 år gammel jente klager over at hun blir fort sliten i beina ved ordinær førskolekontroll på helsestasjonen. Ved klinisk undersøkelse er det normale funn over hjerte, lungene og i abdomen, men du finner ikke lyskepulser. Nevrologisk undersøkelse viser normale funn i beina, inklusiv normal muskelstyrke og reflekser.
Hva bør legen gjøre nå?

A Henvise til nevrologisk poliklinikk for videre utredning
B X Henvise til barnekardiologisk poliklinikk for ekkokardiografi av hjertet
Det sentrale punktet her er manglende lyskepuls som må verifiseres og utredes først før andre årsaker til slitenhet i beina kan vurderes. Kan være uttrykk for ikke-duktusavhengig koarktasjon
C Henvise til barnepoliklinikken for utredning for kronisk utmattelsessyndrom
D Henvise til fysioterapeut fordi jenta må trene for å få bedre kondisjon

---

00001657c362545ae0

82
Du skal vurdere om et barn har et vekstavvik og har følgende opplysninger: Gutt, født til termin med fødselslengde 50 cm og fødselsvekt 3500 g. Hans høyde har ligget på 50-percentilen for alder fram til han var 7 år. Nå 10 år gammel ligger høyden på 10-percentilen. Skjelettalder er 9 år.
Foreldreopplysninger: Mor er 167 cm og far er 180 cm. Begge kom i pubertet til normal tid.
Hvilken forklaring på guttens vekstmønster er mest sannsynlig?

A Kromosomavvik
B Konstitusjonelt forsinket vekst og pubertet
Ikke sannsynlig med pubertet til normal tid hos far samt skjelettalder tilnærmet lik kronologisk alder.
C X Kronisk sykdom
D Medfødt hypofysesvikt

00001657c362545ae0

83
Fastlegen blir kontaktet av helsesøster med ansvar for flyktningemottaket i kommunen. Mohamad, 18 mnd, har nettopp kommet til mottaket med sine foreldre fra en flyktningeleir i Somalia. Helsesøster forteller at han var syk med feber, røde øyne og sår hals i 3-4 dager før reisen til Norge, men kviknet til og var afebril under reisen. Dagen etter ankomst til flyktningemottaket har han igjen blitt høyfebril med et makulopapulært utslett over store deler av kroppen. Han er uvaksinert, og helsesøster er redd for at han kan ha meslinger.
Hva bør legen gjøre?

A X Varsle kommuneoverlegen, ta prøver av barnet og isolere det i en uke
Korrekt
B Varsle ansvarlige ved mottaket, gi barnet MMR-vaksine og paracetamol
MMR vaksine hjelper ikke etter symptomutbrudd
C Varsle myndighetene, ta prøver av barnet og gi det en ukes penicillinkur
Penicillin hjelper ikke mot meslinger. Primærvarsling til kommuneoverlege som varsler videre til myndighetene
D Varsle myndighetene, gi barnet acyclovir og vaksinere yngre søsken
Yngre søsken vil være <9 mndr og SKAL ikke ha levende vaksiner. Acyclovir brukes ikke ved meslinger
E Varsle kommuneoverlegen, observere barnet og vaksinere yngre søsken
Yngre søsken vil være <9 mndr og SKAL ikke ha levende vaksiner

---

00001657c362545ae0

84
Hanna er 8 år og tidligere frisk. Hun kommer til sykehuset med ambulanse. Foreldrene har funnet henne i sengen ukontaktbar med generaliserte kloniske kramper. Det varte 2 minutter etter at de oppdaget det. Hun er litt sløv når hun kommer, har ikke feber, er ikke nakkestiv og du finner ikke noen fokale utfall ved nevrologisk status. Mor forteller at hun for noen uker siden, tidlig på morgenen kom til foreldrene og at de da opplevde at hun en kort tid (<1 minutt) ikke kunne snakke, men var helt bevisst.

EEG noen dager etter viser: Sentrotemporale spikes (Rolandic spikes)
Hvilket epilepsisyndrom er den mest sannsynlige diagnosen?

A X Benign barneepilepsi (BECTS)
Tytypisk alder, EEG bilde og kramp semiologi (krampe beskrivelse).
B Juvenil myoklon epilepsi
Ikke typisk alder, EEG bilde. Har ikke fokale komponenter
C Absensepilepsi
Ikke typisk EEG bilde. Har ikke fokale komponenter
D Landau-Kleffner syndrom
Ikke typisk alder, EEG bilde. Har og alvorlig tileggs symtomer med tap av språkfunksjon

00001657c362545ae0

85
Et barn på 1 år får påvist anemi med hemoglobin på 7,1 g/dl. Foreldrene sier han spiser lite fast føde, men drikker mye melk. Fødselsvekt tilsvarte 50-percentilen og ved dagens undersøkelse ligger vekten på 2,5-percentilen. Barnet er blekt i huden, ellers normal klinisk status.
Du har en klar mistanke om årsak til anemien, hvilken av følgende blodprøver ville du rekvirert for å bekrefte mistanken din?

A X Ferritin
Basert på alder og sykehistorie er det mistanke om jernmangelanemi. Diagnosen bekreftes ved å måle ferritin som oftest da er lav (obs akuttfaseprotein). MCV kan også være lav ved jernmangel, men er i seg selv ikke diagnostisk. Hemoglobintyping er aktuelt ved mistanke om hemoglobinopati, disse vil som regel presentere seg ila første leveår. Bilirubin vil være forhøyet ved hemolytisk anemi og da oftest også ikterus.
B Hemoglobintyping
C MCV
D Bilirubin

00001657c362545ae0

86
Du er lege ved helsestasjon. Du undersøker en gutt som er på 6-måneders kontroll. Ved undersøkelse av skrotum, finner du en testikkel i skrotum på venstre side. På høyre side finner du ingen testikkel i skrotum eller lysken. Hva gjør du videre?

A Konkluderer med at gutten mangler høyre testikkel og ingen videre oppfølging.
B X Henviser til barnekirurg/urolog
Mistanke om retentio testis som skal vurderes av barnekirurg/urolog
C Avventer ytterligere descens og tar gutten inn til kontroll ved 1-års alder

00001657c362545ae0

87
Tidligere frisk 5 år gammel gutt kommer til legevakt med 3 dagers febersykdom. Du hører en grad 2 tidlig systolisk lavfrekvent bilyd ved midtre og nedre venstre sternalrand uten utstråling, som ikke er hørt tidligere ved de regelmessige helsestasjonskontroller. Klinisk undersøkelse tyder på en øvre luftveisinfeksjon.
Hva gjør du videre med tanke på bilyden?

A X Ber de oppsøke primærlege for kontroll av bilyden når barnet er frisk igjen
Du har en aktuell ØLI som forklarer guttens feber og det er ikke oppgitt noe informasjon som skulle tyde på endokarditt eller annen hjertesykdom. Bilyden er trolig fysiologisk og hørbar nå ved akutt sykdom der hjertets arbeid er økt.
B Henviser til barnekardiolog
C Dette er en bilyd uten behov for videre oppfølgning, ingen avtale om kontroll
D Legger barnet inn til utredning for endokarditt

00001657c362545ae0

88
Du jobber som turnuslege på et fastlegekontor hvor dagens første pasient er en gutt på 3 år. Mor forteller at han har hanglet med forskjellige luftveisinfeksjoner de siste månedene og hun syns han er blekere enn vanlig. Ved klinisk undersøkelse har han 38,4°C i temperatur og er i redusert allmenntilstand. Du finner multiple små glandler på collum, forstørrede tonsiller og hepatosplenomegali. Orienterende blodprøver på legekontoret vises i tabellen under. Hva er mest sannsynlige diagnose hos dette barnet?

Prøve:	Svar:	Referanseområdet:
CRP	36 mg/l	<5 mg/l
Hb	8,3 g/dl	10,5 - 13,1 g/dl
Trombocytter	126 x 10^9/l	228-435 x 10^9/l
Leukocytter	15,9 x 10^9/l	3,7 - 14,7 x 10^9/L

A X Akutt leukemi
Pasienten har vært syk over lengre periode og har både anemi og trombocytopeni, lett leukocytose, hepatosplenomegali og infeksjon. Dette er en vanlig presentasjonsform for akutt leukemi, og er mest sannsynlige diagnose (tot.leukocyttall kan være både lavt, normalt og høyt ved leukemi. Nøytropeni er vanlig.). Mononukleose kunne vært en aktuell problemstilling hos pasienter med store tonsiller og hepatosplenomegali, men er vanligvis asymptomatisk hos barn < 10 år. Mononukleose gir heller ikke så uttalt anemi eller trombocytopeni. HUS kjennetegnes av triaden anemi, trombocytopeni og nyresvikt. >90 % av tilfellene er assosiert med E. Coli gastroenteritt og har akutt debut. Pasientene har ofte magesmerter og blodig avføring. Anemien utvikles raskt og pasientene kan være påvirket kardiorespiratorisk. I aktuelle sykehistorie har pasienten vært syk over lengre tid og har ikke gastroenterittsymptomer som derfor taler mot HUS. Parvovirus B19 er oftest asymptomatisk, men kan gi benmargssupresjon. Det er sjelden like uttalt som her. Det gir heller ikke hepatosplenomegali.
B Parvovirus B19
C Hemolytisk uremisk syndrom
D Mononukleose

00001657c362545ae0

89
En mor kommer med sin 12 måneder gamle gutt til en sjekk hos deg på fastlegekontoret. De har nylig flyttet hit som flyktninger fra et sentralafrikansk land. Gutten har vært rimelig frisk hele livet, fullammes fortsatt og vokser ganske bra. Mor sier likevel at han virker litt blek i det siste og ettersom han også i to dager har hatt lett feber, hoste og rennende nese ble det tatt en hematologisk status med eneste funn en lav Hb på 8.8 g/dL (ref. 10.5-13.1).
Hva er mest sannsynlig årsaken til guttens anemi?

A X jernmangel
Riktig. Ved fravær av annen informasjon er jernmangel vanligste årsak til anemi, uansett hvor i verden de kommer fra. Her er det også fullamming som et hint da det fra iallefall 6 måneders alder må tilføres jern i kosten for å sikre nok.
B malariasykdom
C sigdcellesykdom
D G6PD-mangel

00001657c362545ae0

90
Du jobber som legevakt og det kommer et barn på 3,5 år som har hatt kloniske rykninger i kroppen. Barnet har høy feber og er tidligere frisk. Hvilken av følgende tilleggsopplysninger tilsier at dette bør behandles som en komplisert feberkrampe?

A X Det var et nytt anfall etter 4 timer
Hvis flere anfall innen 24 timmer skall det vurderes dette som en komplisert feberkrampe
B Anfallet var 5 minutter langt
Feberkarmper lengre en 15 minutter vurderes som kompliserte
C De kloniske rykningene var bilateralt
Hvis unilaterale symptomer vurderes det som en komplisert feberkrampe
D Ingen av disse

00001657c362545ae0

91
Hydroklortiazid, furosemid, spironolakton og amilorid tilhører alle legemiddelgruppen diuretika. To av disse midlene kan gi hyperkalemi som bivirkning.
Hvilke av legemidlene er det?

A X Spironolakton og amilorid
Begge disse er kaliumsparende diuretika. Amilorid er kanskje lite kjent, men studentene bør kunne dedusere seg fram til riktig svar fordi de andre alternativene inneholder enten furosemid eller hydroklortiazid (som de bør kjenne til at gir hypokalemi).
B Hydroklortiazid og furosemid
Begge disse gir tendens til hypokalemi
C Furosemid og spironolakton
Furosemid gir tendens til hypokalemi
D Amilorid og hydroklortiazid
Hydroklortiazid gir tendens til hypokalemi

00001657c362545ae0

92
Hvilket av de nedenstående diuretika er spesielt aktuelt å benytte hos pasienter med hyperaldosteronisme?

A Hydroklortiazid (et tiazid-diuretikum)
B Mannitol (et osmotisk diuretikum)
C X Spironolakton (et kaliumsparende diuretikum)
Spironolakton er en aldosteronantagonist.
D Furosemid (et loop-diuretikum)

00001657c362545ae0

93
Hvilken av de nedenstående tilstandene utgjør en indikasjon for bruk av betablokkere?

A Addisons sykdom
B Parkinsonisme
C X Migrene
Betablokkere brukes som profylakse
D Raynauds fenomen

00001657c362545ae0

94
Regulære analgetika virker dårlig ved nevropatiske smerter. Ved slike tilstander kan man bl.a. forsøke farmakoterapi med trisykliske antidepressive midler (vanligvis nortriptylin eller amitriptylin), tradisjonelle antiepileptika slik som karbamazepin eller valproat, eller gabapentinoider slik som gabapentin eller pregabalin. Hos pasienter med redusert nyrefunksjon må vi tilpasse doseringen av to av de legemidlene som er nevnt ovenfor, fordi de utskilles uomdannet gjennom nyrene.
Hvilke to legemidler er dette?

A X Gabapentin og pregabalin
Korrekt svar
B Nortriptylin og amitriptylin
C Karbamazepin og valproat
D Karbamazepin og pregabalin

00001657c362545ae0

95
En kvinne fullammer et seks uker gammelt barn. Hun må bruke et legemiddel som potensielt kan ha effekt på barnet. For å vurdere om legemiddelbehandlingen vil være trygg for barnet, må du blant annet regne ut barnets *teoretiske dose,* altså hvor mye legemiddel barnet teoretisk inntar.
Hvordan beregnes teoretisk dose?

A En multipliserer mengden av melk som inntas (ca. 150 ml per kg kroppsvekt per døgn) med konsentrasjonen av legemidlet i mors serum
ikke TD, tar ikke høyde for varierende grad av overgang i morsmelk fra serum
B En dividerer mengden av melk som inntas (ca. 150 ml per kg kroppsvekt per døgn) med konsentrasjonen av legemidlet i melken
C X En multipliserer mengden av melk som inntas (ca. 150 ml per kg kroppsvekt per døgn) med konsentrasjonen av legemidlet i melken
ref LM-handboka
D En måler serumkonsentrasjonen av det aktuelle legemidlet i barnets blod og multipliserer dette med barnets blodvolum (ca 500 ml)
ikke TD

00001657c362545ae0

96
En 68 år gammel mann har en mild astma og bruker salbutamol som inhalasjon ved behov, men er ellers frisk. Blodtrykket ved de to siste kontrollene hos deg på fastlegekontoret har ikke vært tilfredsstillende (170/100 mmHg), og du vurderer oppstart av medikamentell behandling.
Hvilken type blodtrykkssenkende middel bør man være forsiktig med hos denne pasienten?

A ACE-hemmer
Ingen kontraindikasjoner i sykehistorien, kan benyttes som førstevalg.
B Tiaziddiuretikum
Ingen kontraindikasjoner i sykehistorien, kan benyttes som førstevalg.
C Kalsiumkanalblokker
Ingen kontraindikasjoner i sykehistorien, kan benyttes som førstevalg.
D X Beta-1-reseptorantagonist
Betablokkere gir risiko for obstruksjon og kan utløse alvorlig astmaanfall hos astmatikere. Dette gjelder også for selektive beta-1-blokkere, selv om risikoen er noe mindre enn for uselektive betablokkere.

00001657c362545ae0

97
En ung kvinne bruker isotretinoin mot akne. Hun seponerer legemiddelet, får eggløsning en uke etterpå og blir gravid. Hun oppsøker deg som LIS1 i allmennpraksis i svangerskapsuke 8.
Hvordan er det riktigst å resonnere i denne situasjonen?

A Du bør råde henne til øyeblikkelig svangerskapsavbrudd grunnet stor risiko for fosterskade
B Hun trenger ikke å bekymre seg siden hun seponerte legemiddelet såpass lenge før eggløsning
C Hun trenger ikke å bekymre seg siden isotretinoin kun er fosterskadelig i 3. trimester
D X Hun bør omgående henvises til spesialist i gynekologi og fødselssykdommer for undersøkelse og råd
«Dersom graviditeten forekommer etter avsluttet behandling, er det gjenværende risiko for alvorlig misdannelse av fosteret. Denne risikoen vedvarer inntil legemidlet er fullstendig eliminert, og det er én måned etter avsluttet behandling» fra SPC enn det som står nå.
Version 1,12/2005 (legemiddelsok.no) - https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/07-5311.pdf

---

98
Legemidler i gruppen fosfodiesterase-5-hemmere, som for eksempel sildenafil, skal ikke brukes sammen med glyseroltrinitrat (nitroglyserin) og andre nitrater.
Hva er årsaken til dette?

A Kombinasjonen kan gi nyresvikt
Man kan eventuelt tenke seg nyresvikt sekundært til et ekstremt blodtrykksfall, men blodtrykksfallet er uansett det primære.
B Kombinasjonen kan gi forlenget QT-tid med risiko for *torsades de pointes*-arytmier
C X Kombinasjonen kan gi kraftig blodtrykksfall
Legemidler i begge gruppene virker vasodilaterende, og hvis man kombinerer, får man en svært kraftig vasodilaterende effekt. Altså en farmakodynamisk interaksjon.
D Kombinasjonen kan gi kramper

99
En kvinne oppsøker deg i allmennpraksis. Hun har nylig oppdaget at hun er gravid, og en ultralydundersøkelse har vist at hun har en svangerskapslengde omtrent svarende til 16 uker. Hun bruker relativt hyppig ibuprofen (et NSAID) mot hodepine.
Hvordan er det riktigst å resonnere i denne situasjonen?

A Hun kan bruke ibuprofen som før da det ikke er vist noen fosterskadelige effekter av legemiddelet
B Hun kan bruke ibuprofen som før da ibuprofen kun gir risiko for fosterskade ved bruk i første trimester og kritisk periode allerede er tilbakelagt
C X Hun bør redusere bruken av ibuprofen så mye som mulig, særlig mot slutten av svangerskapet
G7.1.14 N | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) - https://www.legemiddelhandboka.no/G7.1.14/N
D Bruk av ibuprofen i første trimester gir høy risiko for fostermisdannelser og hun bør informeres om dette slik at hun kan vurdere svangerskapsavbrudd

---

100
Kombinasjonen ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) og ACE-hemmere eller angiotensinreseptorantagonister er forbundet med høy risiko for nyresvikt.
Hva er mekanismen bak denne interaksjonen?

A Redusert angiotensin-2-virkning reduserer aldosteronproduksjonen. Dette gir tendens til hyperkalemi, som sammen med NSAIDs virker nyretoksisk
Dette er ingen kjent mekanisme for nyretoksisitet.
B NSAIDs forsterker den blodtrykkssenkende effekten av ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister, noe som kan gi hypotensjon og utløse en prerenal nyresvikt
Tvert imot, NSAIDs svekker den blodtrykkssenkende effeten av ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister.
C ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister gir en opphopning av bradykinin, som i kombinasjon med redusert prostaglandinsyntese i nyrene ved NSAID-behandling reduserer nyreperfusjonen og filtrasjonstrykket i glomeruli
Angiotensinreseptorantagonister gir ikke opphopning av bradykinin.
D X NSAIDs og ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere reduserer nyreperfusjonen og filtrasjonstrykket i glomeruli via komplementære mekanismer (hhv. hemmet prostaglandinsyntese og hemmet angiotensin-2-virkning)
Prostaglandiner dilaterer afferente arteriole, mens angiotensin 2 konstringerer efferente arteriole. Disse mekanismene bidrar begge til å opprettholde filtrasjonstrykket. Når begge mekanismene hemmes samtidig, gir det redusert nyreperfusjon og filtrasjonstrykk.

101
Små barn har umoden nyrefunksjon i forhold til større barn og voksne.
Hvordan påvirker dette halveringstiden til legemidler som i stor grad utskilles uforandret via nyrene?

A X Halveringstiden blir lengre på grunn av redusert GFR og redusert tubulær sekresjon
Både GFR og tubulær sekresjon er gjenstand for aldersavhengig modning og betraktes i alminnelighet å være omtrent på normalt nivå innen 6-9 måneders alder (NB. gjelder fullbårne).
B Halveringstiden blir omtrent den samme på grunn av redusert GFR, men økt tubulær sekresjon
C Halveringstiden blir kortere på grunn av økt tap gjennom glomeruli
D Halveringstiden blir kortere på grunn av økt tubulær sekresjon

---

102
En pasient bruker levotyroksin på indikasjon primær hypotyreose og er godt regulert med normal fritt tyroksin i serum (s-fT4) og tyroideastimulerende hormon i serum (s-TSH). Hun begynner på eget initiativ med kalsiumtilskudd fordi hun er redd for å utvikle osteoporose. Begge legemidlene tar hun klokken 08.00 på morgenen. Du får pasienten på en rutinekontroll 8 uker etter oppstart med kalsium for å måle s-fT4 og s-TSH.
Hvordan vil prøvesvarene mest sannsynlig være?

A Nedsatt s-fT4 og nedsatt s-TSH
B Økt s-fT4 og nedsatt s-TSH
C X Nedsatt s-fT4 og økt s-TSH
https://tidsskriftet.no/2002/09/legemidler-i-praksis/medikamenter-og-thyreoideafunksjon
D Økt s-fT4 og økt s-TSH

103
Du blir tilkalt for å vurdere et nyfødt barn som ble forløst med keisersnitt på mors indikasjon. GA 36+6. Initialt selvpustende og sprek. Senere slapp og behov for CPAP. Det rekvireres et røntgenbilde. Vakthavende radiolog er opptatt med et traume, så du må vurdere bildet selv.
Hvilken tilstand er best forenlig med det foreliggende røntgenbildet?



A Høyresidig pneumothorax
Ingen hyperklare områder, men så klart vanskelig å utelukke mindre pneumothorax ved liggende bilder.
B Våte lunger
Differentialdiagnose hos sectioforløste barn. Aktuelle bildet uten åpenbar pleuravæske eller stuvningspregete sentrale hiluskar.
C Mekoniumaspirasjon
Ingen info om misfarget fostervann. Ingen hyperinflasjon. Ville forvente asymmetriske grove, flekkvise fortetninger.
D X RDS
Symmetriske fingranulære tegninger.

00001657c362545ae0

104
Hvilken bildeundersøkelse gir den mest detaljerte fremstillingen (høyest ratio mellom signal og støy) av testiklene?

A X Ultralyd med høyfrekvent probe
Testiklene ligger nært mot overflaten som muliggjør bruk av høyfrekvent probe. Høyfrekvent probe har redusert penetrasjon, men høy oppløsning.
B Ultralyd med lavfrekvent probe
Lavfrekvent probe har langt lavere oppløsning enn høyfrekvent probe
C MR
D CT med kontrastmiddel og tynnsnitt

00001657c362545ae0

105
Hvilken tilstand kan ikke avklares når man henviser til en røntgen miksjonscysturethragrafi (MCUG)?

A Resturin
Urinblæren fylles helt til barnet må tisse. Gjenværende kontrast i urinblæren er en indikator på resturin, men det er vanskelig å ansla mengde/volum. For dette vil en UL eller urodynamisk us. vere bedre egnet.
B X Overgangsstenose
Denne tilstanden avklares hovedsakleg med røntgen urografi eller NM renografi (i framtiden dynamisk MR urografi).
C Vesikoureteral refluks (VUR)
D Bakre urethraklaff

00001657c362545ae0

106
Du henviser et 2-dager gammelt nyfødt guttebarn til en UL urinveier. I radiologirapporten står det: "Uregelmessig, uttalt veggfortykket urinblære. Utvidete ureteres. Moderat dilatasjon av begge nyrenes intrarenale samlesystem. R: Sterk mistanke om ..."
Hvilken tilstand mistenker radiologen?

A Bilaterale overgangsstenoser
B X Bakre urethraklaff
Bilateral hydronefrose: Sentral obstruksjon er mye mere sanns. en bilateral proksimal obstruksjon. Veggfortykkelse i urinblæren skyldes hypertrof muskulatur som et forsøk på øke trykket proksimalt for obstruksjon. Den minst vanlige, men mest alvorlige tilstanden hos gutter (og kun gutter) er bakre uretraklaff.
C Bilaterale distale ureterstenoser
D Bilaterale vesikoureterale refluks (VUR)

00001657c362545ae0

107
Prematurt fødte før uke 32 blir rutinemessig utredet med ultralyd caput etter fødsel.
Hva er det man da primært ønsker å utelukke/påvise og som ultralyd er godt egnet til?

A Hypoksisk ischemisk encefalopati
B Hydrocephalus
C X Hjerneblødninger
Premature er spesielt utsatt for blødning i germinal matriks, da blodårene her er ekstra sensitive for hypoksi og økt blodtrykk. Blødning her kan være en årsak til utvikling av CP, men dette er en samlebetegnelse på forstyrrelser i muskelfunksjon og kan ikke påvises med ultralyd. Man ville aldri «screenet» for hydrocephalus postnatalt, det er oftest påvist på prenatal UL. HIE er en klinisk entitet etter asfyksi.
D Cerebral parese

00001657c362545ae0

108
Pasientenes prostatakreftorganisasjon PROFO har lenge ønsket populasjonsbasert screening med PSA for å oppdage prostatakreft i en tidlig fase. Fagmiljøet har nå begynt å se på mulighetene for å organisere testingen også i Norge- hva er hovedårsaken til dette tiltak?

A Behandlingen av prostatakreft har nå blitt mer skånsom og nærmest uten bivirkninger.
B Randomiserte studier både fra Europa og USA har vist en reduksjon av totalmortalitet hos de menn som ble randomisert til screening.
C X Prostatakreftspesifikk mortalitet er 20% lavere hos menn som screenes og vildscreening er økende.
Med vildscreening menes at andelen menn som kontrollerer sitt PSA utenfor er organisert programm er økende. Dette innebærer at man ofte tar prøven feilaktig noe som er vist ikke leder til redusjon i PCa spesifikk dødlighet. Med populasjonsbasert screening er det dog problemer med overdiagnostikk og overbehandling. Norsk Urologsik Forening ser på muligheten å organisere testingen med regionale prosjekt.
D PSA-testen har blitt utviklet og kan nå gi mer sikker informasjon om sannsynligheten for prostatakreft.

00001657c362545ae0

109
En kvinne på 30 år oppsøker fastlegen på grunn av svie ved vannlating. Urinstix viser 3+blod og 3+ hvite, nitritt pos. Pas er afebril.
Hva bør fastlegen gjøre i dette tilfellet?

A Forordne resept på 3 dagers behandling med antibiotika og henvisning til cystoskopi.
Cystoskopi er foreløpig ikke indisert.
B X Forordne resept på 3 dagers behandling med antibiotika og kontroll av urin etter et par uker.
Dette er tilstrekkelig for en yngre pasient. Ny urinprøve taes for å kontrollere mikrohematurien.
C Forordne resept på en ukes behandling med antibiotika og UL av urinveiene på grunn av mikrohematuri.
En ukes behandling er noe for lenge på ukomplisert UVI. UL er foreløbig ikke indisert.
D Ta blodprøver mhp. infeksjonsparametre. Sende urin til dyrkning og evt. forordne resept på 3 til 5 dagers behandling med antibiotika ved påvisning av en bakteriestamme.
Ved enkel UVI hos en yngre kvinne er det ikke påkrevet med urindyrk og lab.utredn.

00001657c362545ae0

110
En 40 år gammel tidligere frisk kvinne, nylig hjemkommet fra en uke i Spania, oppsøker legevakta grunnet intense smerter i ve fossa. Hun har hatt smerter i 2 døgn, men nå fungerer ikke Voltaren og Paracet lenger. Hun har temp 38,2 og føler seg slapp og elendig.
Lab:
CRP 50 (ref. < 5 mg/L)
leukocytter 18 (ref. 4,1 - 9,8 x 10^9/L)
kreatinin 164 (ref. 45 - 90 µmol/L)
urin stix: ery 3+, leukocytter 3+, pos nitritt, neg albumin og neg glukose (ref. neg)
Hva er riktig håndtering av pasienten?

A Mistenke akutt pyelonefritt, sende urin til dyrkning og gi pasienten resept på antibiotika Pivmecillinam 400 mg x4.
B X Bestille ultralyd urinveier akutt for å utelukke hydronefrose, og legge pasienten inn for intravenøs antibiotikabehandling.
Smerter i ve fossa med intense smerter og pos u-stix indikerer obstruerende nyrestein. Med infeksjonstegn er det viktig å utelukke hydronefrose (CT er et dårligere alternativ grunnet høy kreatinin) og behov for avlastning av nyren.
C Mistenke akutt divertikulitt, og grunnet smertelokalisasjon bestille en CT abdomen og vurdering av vakthavende kirurg.
D Bestille CT abdomen da dette er noe uavklart og legge pasienten inn med smitteisolasjon.

00001657c362545ae0

111
En 80 år gammel mann med moderate vannlatingsplager får urinretensjon. Han tappes for 800 ml klar urin. Hvilken videre strategi er best?

A Permanent kateter i en uke, sjekke resturin når kateteret er fjernet
med tidligere moderate plager og 800 ml i blæren er det nok med kateter 1 til 2 døgn før man prøver å fjerne det for å se om vannlatingen kommer igang som før
B X Innlegging av permanent kateter som fjernes etter 1 til 2 dager
Ikke så stort retensjonsvolum. Her kan man forvente at vannlatingen vil normaliseres igjen
C Permanent kateter og henvisning til uroterapeut for opplæring i RIK (ren intermitterende kateterisering) innen 1 uke
Her kan man først se om vannlatingen kommer igang spontant
D Innlegging av permanent kateter, ta blodprøver inkludert PSA og henvise urolog
PSA vil være påvirket av urinretensjon og kan gi falsk forhøyet verdi og skal ikke tas i en akuttsituasjon

---

00001657c362545ae0

112
En 75 år gammel mann, tidligere frisk , oppsøker sin fastlege på grunn av økende plager i form av slapphet, smerter i ryggen, dårlig trykk ved vannlating og urinlekkasje. Siste uken har han hatt problem med å tømme blæren. Som fastlege ønsker du en urinprøve og pasienten tømmer ca 2 dl grumset urin. Han føler at han ikke er helt tømt og som fastlege finner du ved bladderscan at pasienten har 12 dl resturin. Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A X overflowinkontinens
Pasientens plager er typisk for det man benevner overflowinkontinens. Blæren er så full at sfinter av og til gir etter.
B urgeinkontinens
er en tilstand der det er vanskelig å holde seg på grunn av svært sterk vannlatingstrang. Det er ikke tilfellet her.
C detrusorinkontinens
finnes ikke
D stressinkontinens
Stressinkontinens hos menn finner man etter radikalkirurgi for prostatatkreft eller annen kirurgi som har svekket lukkemuskelen. Det er ikke tilfelle her.

00001657c362545ae0

113
En 45 år gammel mann oppøker legekontoret på grunn av en smertefull og hoven venstre skrotalhalvdel. Tilstanden har utviklet seg til det verre over 2-3 dager. Det er smertefullt og ved palpasjon synes grensene mellom testikkel og bitestikkel å være utvisket. Hvilke prøver hjelper deg mest med å kunne stille en diagnose?

A X Leucocytose og leucocytter i urin
ved epididymitt har man ofte både forhøya antall leucocytter i blod og/eller urin
B beta-HCG og AFP
tumormarkører er kun aktuelt å ta når man har påvist tumor i en testikkel
C PSA
PSA er aktuelt å ta ved mistanke om prostatacanser
D Urinsyre
Ikke aktuelt

00001657c362545ae0

114
Hvordan defineres mikrohematuri på urinstix?

A som minimum 3+ på urinstix på 3 prøver med 1 måneds mellomrom
minimun 2+ er riktig
B som minimum 1+ på urinstix på 3 prøver med 1 måneds mellomrom
defineres ikke som mikrohematuri
C som minimum 4+ på urinstix på 3 prøver med 1 måneds mellomrom
minimum er 2+
D X som minimum 2+ på urinstix på 3 prøver med 1 måneds mellomrom
man må ha minst 2+ for å kunne si at man har mikrohematuri etter definisjonen

---

00001657c362545ae0

115
En ellers frisk 36 år gammel mann har levert en urinprøve til fastlegen i forbindelse med legeerklæring for flysertifikat. Urinstix viser 1+ på blod. Hva bør du som fastlege gjøre videre?

A Ta en ny urinprøve om 4 uker
ikke nødvendig siden 1+ ikke er definert som mukrohem
B Henvise til cystoskopi og CT urinveier
Ikke indisert
C X Ingen videre tiltak
Pas har ikke mikrohematuri eller symptomer fra urinveiene og ytterligere utredning er da ikke indisert. Mikrohematuri har man når urin stix viser minst 2+ på urin stix
D Henvise pasienten til cystoskopi
ikke indisert når pas ikke har mikrohematuri

00001657c362545ae0

116
Du har en pasient med smerter hvor du mistenker at diagnosen kan være nyrestein. Hvilket funn i urinen er mest forenlig med nyrestein?

A X mikrohematuri
Man finner mikrohematuri i 90% av pasientene med stein i urinveiene.
B alkalisk urin-pH
feil
C signifikant bakteruiri
kan finnes ved steinsykdom men ikke så hyppig som mikrohematuri
D erytrocyttsylindre i urinsediment
ikke assosiert med nyrestein

00001657c362545ae0

117
Vannlatinsproblem kan inndeles i lagringssymptomer og tømmesymptomer. Hvilket begrep er et tømmesymptom?

A X hesitasjon
hesitasjon betyr vansker med å starte vannlatingen og skyldes gjerne en obstruksjon i prostata/ uretra og har med selve tømmingen å gjøre
B nocturi
betyr at blæren må tømmes om natten, altså et lagringssymptom
C urgency
Urgency betyr kraftig trang til å late vannet og knyttes til blærens lagringskapasitet
D pollakisuri
pollakisuri eller hyppig vannlating er et uttrykk for at blæren ikke rommer så mye urin, altså et lagringsproblem

---

00001657c362545ae0

Testen har 117 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort fasitendringer på 0 oppgaver.